

اولین عمل جراحی واژینوپلاستی موفقیت‌آمیز با روش اب وارتون مک‌ایندو^(۱) با استفاده از Rigid vaginal form و گرفت^(۲) آمنیون در بیماری با آژنزی مادرزادی واژن، در شهر زنجان

دکتر منیره آهنچیان *

خلاصه:

خانم ۳۳ ساله‌ای با آمنوره اولیه که به دلیل عدم توانانی Coit مراجعه کرد و با تشخیص آژنزی کامل مولرین (سندرم مایر راکیتانسکی) تحت عمل جراحی واژینوپلاستی موفقیت‌آمیز با روش مک‌ایندو قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: ایران، زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، مجاري مولرین، آژنزی واژن، واژینوپلاستی Vaginal، آژنزی مک‌ایندو From cone، یا

مقدمه:

ممکن است همراه با این آنومالیها باشد، که شایعترین آن مربوط به سیستم ادراری است که در ۴۰ درصد موارد دوپلیکاسیون سیستم ادراری، ۱۵ درصد آژنزی یک کلیه (۱) و ۱۲ - ۵ درصد آنومالیهای اسکلتی می‌باشد (۶). تشوریهایی که برای عدم نمو یا پیشرفت این مجاري ارائه شده است عبارتند از (۳):

۱ - تولید نایجای ماده مهار کننده نمو این مجاري از گناد بیمار مبتلا.

۲ - توارث اتوژومال غالب که محدود به جنس مؤنث می‌باشد و توسط یک زن موتانت از یک فامیل مذکور انتقال می‌یابد (معمولأً ارتباط پدری در زن مبتلا وجود دارد).

۳ - در معرض تراوتونها قرار گرفتن امبریو در

حدود ۳۷ روز بعد از لقاح، مجاري مولرین برای اولین بار در نزدیکی مهره T4 (مهره چهارم توراسیک) جنین قابل شناسایی است (۳) از رشد و نمو این مجاري، رحم، سرویکس، لوله‌های رحمی و $\frac{4}{5}$ فوکانی واژن تشکیل می‌گردد (۱).

اختلالات نمو مجاري مولرین در دوران جنینی منجر به انواع آنومالیهای مادرزادی سیستم تناسلی زنان می‌گردد. به عدم تشکیل واژن در دوران جنینی آژنزی مادرزادی واژن می‌گویند. آژنزی مادرزادی واژن می‌تواند به صورت منفرد باشد و یا همراه با آژنزی سایر قسمتها شامل رحم، سرویکس، لوله‌های رحمی که به آن سندرم مایر راکیتانسکی (Mayer Rokitansky) گفته می‌شود. آنومالیهای سیستمهای دیگر بدن نیز

1 - the Abbe wharton McIndoe

2 - Graft (بافت مورد استفاده برای پرند)

* متخصص زنان و زایمان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان.

IVF و قرار دادن تخم لفاح یافته به داخل رحم یک زن دیگر (رحم اجاره‌ای) وجود دارد (۲).

معروفی بیمار:

بیمار زن ۳۳ ساله‌ای است که آمنوره اولیه داشته ولی با شکایت عدم توانائی Coit مراجعه کرد. در حالی که ۱۶ سال از ازدواج او می‌گذشت و به رغم مراجعات متعدد وی به مراکز درمانی، به علت عدم استطاعت مالی برای مراجعه به بیمارستانهای تهران، بیمار طی این سالها، دیسپارونی شدید را تحمل کرده بود. در معاینه بالینی به جز واژن کور، نکته پاتولوژیک دیگری نداشت. صفات ثانویه جنسی مطابق با یک زن بالغ نرمال بود گناد و تروپینها بالا بود. در سونوگرافیهای متعدد که قبل از بیمار درخواست شده بود، رحم هیپوپلاستیک بسیار کوچک و عدم وجود کانال واژن گزارش شده بود.

جهت بررسی آنومالیهای احتمالی سیستم ادراری IVP درخواست شد که در نتیجه آن مشخص گردید.

بیمار آژنری کلیه ندارد، جایگاه آناتومیک هر دو کلیه طبیعی، سیستم ترشحی کلیه‌ها منفرد، و مثانه نیز طبیعی است.

به دلایل زیر برای بیمار کاریوتیپ درخواست نشد.

۱ - بیمار ۳۳ ساله بود و در بررسی آمنوره اگر گناد و تروپینها بالاتر از نرمال باشد و سن بیمار کمتر از ۳۰ سال باشد کاریوتایپ ضروری است (۱). در بیمار فوق گناد و تروپینها بالا نبود و سن بیمار نیز بالاتر از ۳۰ سال بود. در نتیجه تعیین کاریوتایپ ضرورتی نداشت.

۲ - انجام کاریوتیپ در زنجان مقدور نیست و بیمار باید به تهران ارجاع می‌کرد.

۳ - بیمار بضاعت لازم برای پرداخت هزینه کاریوتیپ را نداشت.

بیمار در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۲۱ با تشخیص قبل از عمل آژنری واژن مورد عمل جراحی قرار گرفت. آنتی بیوتیک وربیدی از ۱۲ ساعت قبل از عمل تجویز شد و

روزهای ۳۷ تا ۴۱.

۴ - فقدان یا کاهش اسیتورهای استروئن در مجاری مولرین.

۵ - نقص در مزانشیم القاکننده این مجاری.

انواع آنومالیهای مولرین به ۷ گروه تقسیم می‌شوند (۴).

۱ - هیپوپلازی سگمنتال که خود شامل ۵ زیر گروه است :

A - آژنری واژن، B - آژنری سرویکس، C - آژنری فوندوس، D - آژنری لوله، E - نوع مرکب.

۲ - رحم یک شاخه

۳ - رحم دو شاخ

۴ - نقاچیس سپتوم

۵ - رحم قوسی

۶ - آنومالیهای مربوط دی اتیل استیل ستrol.

در واژن در ماه سوم زندگی آمبریونیک تشکیل و $\frac{4}{5}$ فرقانی واژن از سیستم مجاری مولرین و $\frac{1}{5}$ تحتانی آن از سینوس اروئینتال تشکیل می‌گردد (۱). کانالیزاسیون واژن تا ماه ششم زندگی جنبی کامل می‌شود (۴).

بیمار معروفی شده در گروه I در زیر گروه E قرار می‌گیرد که در آن واژن، سرویکس، رحم و لوله‌ها تشکیل نمی‌شوند. در آژنری واژن بر اساس رفرنس (۳)، عمل جراحی واژینوپلاستی (ایجاد یک واژن با عمل جراحی) معمولاً بین سالین ۱۷ تا ۲۰ سالگی که بیمار به مرحله بلوغ عاطفی رسیده است انجام می‌شود، ولی در کشور ما، این عمل جراحی پس از ازدواج انجام می‌شود.

با این عمل کانال واژن فقط برای عمل جنسی رضایت بخش؛ ایجاد می‌گردد و در بارداری بیمار تأثیری ندارد. این نکته برای بیمار مورد بحث نیز تفهمیم گردید. امکان فرزند دار شدن زنان با آژنری مولرین، در صورت سوپراولالسیون و بازیافت تخمک از طریق

Rokitansky kuster Hanser) سندروم رحم سروپکس و فوچانی واژن شکل نمی‌شود. تخدمد آنها معمولاً نرمال است (۱). شیوع آنژزی واژن یک مورد در هر ۱۵۸۱ تولد دختر است (۲).

این بیماران در سنین بین ۱۴ تا ۱۶ سالگی به دلیل آمنوره اولیه به زنیکولوژیست مراجعه می‌کنند. یک معاينه دقیق دستگاه تناسلی خارجی لازم است. بسیار دقتی در معاينه، سبب به تأخیر افتادن تشخيص و تجویز داروهای هورمونی متعدد جهت القای قاعدگی می‌گردد (۵).

پس از تشخیص عدم وجود واژن، بوكال اسمیر برای بررسی کروماتین بادی انجام می‌گیرد و اگر وجود نداشت آنالیز کروموزومی کامل صورت می‌گیرد. بیمار معرفی شده به دلیل عدم توانایی Coit مراجعه کرده بود. پس از اقدامات اولیه، عمل جراحی واژینوپلاستی با تکنیک مک ایندو برای وی انجام شد. در این عمل از پرده آمنیون یا پوست به عنوان گرفت استفاده می‌شود. در بیمار مورد نظر نیز، از پرده آمنیون به عنوان گرفت استفاده شد. پرده آمنیون به عنوان گرفت از یک زایمان به صورت سزارین که مایع آمنیوتیک مکونیال نبود و قبل از زایمان پارگی پرده‌ها وجود نداشت. تهیه گردید (۳). در تکنیک مک ایندو میزان موافقیت ۸۰ تا ۱۰۰ درصد ذکر شده است (۳). عوارض جدی این عمل فیستول یورترو واژینال، وزیکو واژینال و رکتو واژینال، عفونت پس از عمل و خونریزی حین عمل و بعد از عمل می‌باشد. شکست گرفت به عنوان عارضه در بعضی از مطالعات وجود داشته است. شکست به دلیل نشکل نسخ گرانولواسیون است که اگر کم باشد، با نیترات نقره قابل درمان است. در بیمار معرفی شده تب پس از عمل جراحی برای ۵ روز ادامه یافت که با آنی

تا ۷ روز پس از آن ادامه یافت. عمل جراحی با ایجاد یک انزیبون عرضی در حد فاصل مجرای ادرار و آنوس آغاز گردید (۳). blunt dissection با انگشت در دو طرفه رافه میانی در حد فاصل مجرای ادرار و رکتوم انجام و سپس رافه میانی با استفاده از قیچی قطع گردید. در حین عمل کاتتر ثابت ادراری داخل مثانه گذاشته شد و انگشت اندکس دست چپ جراح برای جلوگیری از آسیب به رکتوم در داخل آن قرار گرفت. عمل دایسکشن بدون آسیب رساندن به مثانه یا رکتوم صورت گرفت. پس از ایجاد فضای کافی و هموستان نفاط خون ریزی دهنده، گرفت آمنیون بر روی Cone^(۱) کشیده شد و سوراخهای مطابق با سوراخهای Cone، در آن ایجاد گردید تا ترشحات خارج گردد. سپس Cone داخل واژن جدید قرار داده شد و با چند سوچور به ولو ثابت گردید (۳).

یک هفته بعد، با باز کردن سوچور، Cone خارج گردید و داخل واژن جدید با نرمال سالین استریل شستشو داده شد. پس از آموزش کافی به بیمار در مورد نحوه مراقبت و جای گذاری واژینال فرم؛ ترخیص گردید. سپس پیگیری بیمار به صورت هفت‌های یک بار انجام شد و در هر مراجعه حفره مراقبت واژن جدید از نظر وجود نکروز فشاری بررسی می‌گردید. به بیمار آموزش داده شد تا ۶ هفته پس از ترخیص فقط در هنگام defecation و urination فرم را بردارد. پس از ۸ هفته از زمان عمل جراحی اجازه Coit به بیمار داده شد. بیمار باید برای ۱۲ ماه آینده شبها فرم را قرار دهد و روزها خارج سازد.

بحث:

آنومالیهای مولرین سبب بروز علایم و عوارض متعددی برای بیماران مبتلا می‌گردند. شایعترین نمونه از آنومالیهای ارگانوژن واژن سندروم (Mayer)

۱- Rigid vaginal form (cone) و سبله‌ای به شکل استوانه تو خالی از جنس پلاستیک فشرده است که از سوراخهای متعددی جهت خروج ترشحات واژن جدید استفاده می‌گردد.

Gynecology 8th ed 1997.

4 - Williams, obstetrics 20th Edition. 55

5 - Knab, Mullerian agenesis : a review
Bethesda , Maryland ,1983, 260.

6 - Griffin JE, Edwards,Congenital absence of the vagina. Ann Intern Med,1976. 75.

بیوتیک تراپی وسیع الطیف، تب بدون عارضه قطع شد.

گرچه در بعضی‌ها واژن با طول ۴ سانتی متر کافی است ولی در اغلب موارد واژن کمتر از ۴ سانتی متر مشکلی جدی می‌باشد. در بیمار معرفی شده، طول نهایی واژن ۷ سانتی متر می‌باشد و بیمار دیسپارونی ندارد .

کتابنامه :

1 - Novak's Gynecology , 12th ed Berek 1996.45

2 - Speroff, L et al clinical - Gynecolo - Endocrinology and infertility, speroff 1998, 102

3 - Rock , J.A Te linde's operative