

## مقایسه‌ی آزمون‌های کشت و PCR برای تشخیص عفونت‌های تنفسی مایکوپلاسما پنومونیه

دکتر محمدحسن شاه حسینی\*، دکتر مسعود مردانی\*\*، زهرا حسینی\*\*\*، دکتر حمیدرضا خرم خورشید\*\*\*\*

امیرعباس رحیمی\*\*\*\*\*، دکتر جلیل وند- یوسفی\*\*\*\*\*

نویسنده‌ی مسئول: تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/شهرقدس، گروه میکروبیولوژی shahhosseiny@yahoo.com

دریافت: ۸۵/۱۰/۱۷ پذیرش: ۸۵/۱۲/۲۰

### چکیده

**زمینه و هدف:** مایکوپلاسما پنومونیه عامل گرفتاری‌های تنفسی مانند گلودرد، فارنزیت، رینیت، تراکتوبرونژیت و همچنین مسئول بیش از بیست درصد موارد پنومونی‌های کسب شده از جامعه است. روش‌های متداول تشخیص مایکوپلاسما پنومونیه دارای محدودیت‌هایی است، بنابراین نیاز به به کارگیری روش‌های دقیق دیگر کاملاً احساس می‌گردد. روش‌های مولکولی، از جمله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) دارای پتانسیل زیادی جهت تشخیص دقیق و سریع این عامل بیماری‌زا بوده و در نتیجه می‌توانند امکان شروع هر چه سریع‌تر درمان آنتی‌بیوتیکی بیماری را فراهم نمایند. در این مطالعه سعی شده است روش کشت و PCR مقایسه شده و یک روش سریع و عملی PCR برای شناسایی مایکوپلاسما پنومونیه طراحی و بررسی شود.

**روش بررسی:** بر روی نمونه‌های کلینیکی ۱۰۰ بیمار که با شکایات تنفسی به بیمارستان مراجعه کرده بودند، کشت و PCR انجام شد. یک روش حساس با استفاده از پرایمرهای A و P4B و P1 cytadhesin و هدف ژنی pTZ57R (۳۴۵ bp) به وسیله‌ی روش PCR-Cloning در پالasmid محصول PCR در کلون گردید و جهت تعیین توالی مورد استفاده قرار گرفت.

**یافته‌ها:** همه نمونه‌های کشت مثبت دارای نتیجه‌ی PCR مثبت هم بودند. در ۳۳ نمونه‌ی دیگر که از نظر کشت منفی بودند آزمایش PCR مثبت بود، در نتیجه ۴۳ نمونه از ۱۰۰ نمونه (۴۳ درصد) دارای نتیجه‌ی مستقیم مثبت PCR بودند. حد شناسایی سنیجش مولکولی حاضر در حد ۱۰ ارگانیسم مایکوپلاسما پنومونیه ارزیابی شد. در عین حال با ۱۱ نمونه مایکوپلاسما مورد استفاده و همین‌طور ۱۷ گونه‌ی باکتریابی دیگر مورد استفاده در آزمون ویژگی هیچ محصولی تکثیر نگردید.

**نتیجه‌گیری:** این مطالعه دلالت بر این موضوع دارد که PCR یک روش حساس و قابل اعتماد برای تشخیص سریع مایکوپلاسما پنومونیه در نمونه‌های عفونت‌های تنفسی است.

**وازگان کلیدی:** مایکوپلاسما پنومونیه، تشخیص، کشت، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

\* دکترای تخصصی بیوتکنولوژی (فرآورده‌های بیولوژیک)، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/شهرقدس

\*\* متخصص عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

\*\*\* کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/ شهرقدس

\*\*\*\* متخصص ژنتیک، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

\*\*\*\*\* کارشناس ارشد ژنتیک، مری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/ شهرقدس

\*\*\*\*\* دکترای تخصصی میکروبیولوژی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

## مقدمه

محصول بستگی دارد<sup>(۶)</sup>. پرایمرهای طراحی شده عموماً جهت بخش‌های مشترک ژن  $16\text{S rRNA}$  (۱۹)، ژن اپرون ATPase (۲۰)، ژن  $P1$  (۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴) و یا هدف‌های دیگر مانند ژن فاکتور طولی سازی  $tuf$  (۲۵) طراحی شده است. ژن  $P1$  پروتئینی با وزن مولکولی KDa ۱۶۹ را در باکتری مایکوپلاسما پنومونیه کد می‌کند که نقش مهمی را در شدت بیماری زایی این باکتری از جهت چسبیدن به سلول‌های هدف ایفا می‌نماید<sup>(۲۶)</sup>. اگر چه ژن‌های مشابهی در سایر گونه‌های مایکوپلاسما مشاهده می‌شود، ولی بخش‌های به شدت ثابت موجود در توالی ژن  $P1$  مایکوپلاسما پنومونیه، آن را از نظر طراحی پرایمرهای مخصوص گونه، جذاب نموده است<sup>(۲۷)</sup>. هدف مطالعه‌ی حاضر که در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار انجام گردید، روش کشت و PCR جهت شناسایی مایکوپلاسما پنومونیه در نمونه‌های کلینیکی و بهینه نمودن روش تشخیص کلینیکی است.

## روش بررسی

**سویه‌های باکتریایی:** گونه‌های مولیکوتس به کار رفته در این مطالعه عبارتند از: مایکوپلاسما پنومونیه (NCTC 10119)، مایکوپلاسما آرجینینی، مایکوپلاسما هیورینیس، مایکوپلاسما ارال، مایکوپلاسما سینوویه، مایکوپلاسما گالیناروم (رازی ۱۳۵۰ و ۱۳۴۶)، مایکوپلاسما گالیسپتیکوم (رازی ۱۳۵۵)، مایکوپلاسما اویاپنومونیه (رازی ۱۳۶۴)، مایکوپلاسما آگالاکتیا (رازی ۱۳۴۳)، اوره آپلاسما اوره آلتیکوم (رازی ۱۳۶۹) و اکول پلاسما لیدلاوی. به علاوه میکروارگانیسم‌های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس، استرپتوکوکوس پیوژنر، استرپتوکوکوس پنومونیه، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس میکوئدس، گونه‌های کورینه باکتریوم، گونه‌های کلاستریدیوم، انتروکوکوس فکالیس، اشریشیاکلی، گونه‌های

مایکوپلاسما پنومونیه یکی از عوامل عفونت بخش فوکانی و تحتانی تنفس در انسان بوده و تصویر کلینیکی آن به صورت تراکثوبرونشیت کند پیشرونده همراه با بی‌قراری و سرفه‌های خشک است<sup>(۱، ۲)</sup>. طیف بیماری‌زایی این باکتری، از شکل‌های ملایم فارنژیت و تراکثوبرونشیت تا موارد پنومونی حاد را شامل می‌شود<sup>(۳)</sup>. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده است که این باکتری مسئول بیش از ۲۰ درصد پنومونی‌های کسب شده از جامعه می‌باشد<sup>(۴)</sup>. طیف گسترده‌ای از تظاهرات خارج تنفسی مانند عوارض هماتولوژیک، گوارشی، کلیوی، عضلانی - اسکلتی، قلبی - عروقی، ایمونولوژیک، درماتولوژیک و نورولوژیک در ارتباط با این باکتری گزارش شده است<sup>(۵)</sup>. در حال حاضر کشت، روش‌های تشخیص سروولوژیک و تکنیک‌های تکثیر اسیدنوکلئیک سه روش قابل دسترس برای تشخیص روتین عفونت‌های مایکوپلاسما پنومونیه محسوب می‌شوند. اصولاً روش‌های مبتنی بر کشت، تکنیک‌هایی وقت‌گیر با حساسیت نسبتاً پایین و نیازمند امکانات و هم‌چنین تجربه‌ی کافی جهت تفسیر نتایج هستند<sup>(۶)</sup>. روش‌های سروولوژیک هم به دلیل حساسیت نسبتاً کم، واکنش متقاطع و نیاز به سرم‌های فاز حاد و نقاحت روشی ایده‌آل به شمار نمی‌روند<sup>(۶، ۵)</sup>. در سال‌های اخیر جهت غلبه بر این مشکلات، روش‌های تکثیر اسیدنوکلئیک مانند واکنش زنجیره‌ای پلیمر از Polymerase chain reaction [PCR]، توسعه‌ی فراوانی یافته است<sup>(۷، ۸)</sup>. امروزه روش‌های تشخیصی بر اساس PCR به دلیل داشتن حساسیت، ویژگی و دقت بیشتر، روش‌هایی مناسب جهت تشخیص عواملی هم‌چون مایکوپلاسما پنومونیه به شمار می‌روند<sup>(۹-۱۸)</sup>. میزان حساسیت و دقت PCR، در شناسایی برخی قطعات خاص ژنوم مایکوپلاسما تا حد زیادی به نوع نمونه، روش استخراج DNA، ژن هدف، پرایمرهای طراحی شده و روش شناسایی

دقیقه در دمای جوش حرارت داده شد. بلافضله بعد از حرارت، لوله‌ها در rpm ۱۴۰۰۰ سانتریفوژ شده و مقدار ۵۰ میکرولیتر از مایع روی سدیمان به یک لوله‌ی جدید منتقل شد. از سوش‌های باکتریایی مورد استفاده با استفاده از کیت استخراج DNG-Plus (سیناژن)، داکسی ریبونوکلئیک اسید استخراج (deoxyribonucleic acid [DNA]) استخراج گردید. به طور خلاصه کشت مایکوپلاسمما در مرحله‌ی انتهای فاز لگاریتمی برای ۳۰ دقیقه در rpm ۱۲۰۰۰ سانتریفوژ شد (سویه‌های لیوفیلیزه، در یک میلی‌لیتر آب دوبار تقطیر استریل حل شد و به طور مستقیم و بدون سانتریفوژ کردن وارد مرحله‌ی استخراج گردید). رسوب سلولی حاصل در ۱۰۰ میکرولیتر آب دوبار تقطیر استریل سوسپانسیون گردید. ۵۰۰ میکرولیتر از محلول DNG به لوله‌ی حاوی ۱۰۰ میکرولیتر سوسپانسیون باکتریایی اضافه و بلافضله ورتکس گردید. لوله‌ی حاوی سوسپانسیون و DNG یا Lysate ۲۰، ثانیه شدیداً ورتکس گردید. به Lysate ۳۰۰ میکرولیتر ایزوپروپانول اضافه و سپس ۱۰ بار لوله وارونه گردید. لوله سپس به مدت ۱۰ دقیقه در حرارت اتاق در rpm ۱۰۰۰۰ سانتریفوژ شد. مایع رویی به آرامی و با وارونه کردن لوله تخلیه شد. با استفاده از سمپلر، مایع باقیمانده ببروی رسوب نیز برداشته شد. به رسوب حاصل، ۱ میلی‌لیتر اتانول ۷۵ درجه اضافه و با ۱۰ مرتبه وارونه کردن لوله، محتویات آن به خوبی مخلوط شد. سپس به مدت ۵ دقیقه در rpm ۱۰۰۰۰ سانتریفوژ و مایع رویی تخلیه و مجدداً مرحله‌ی فوق تکرار شد. مایع رویی تخلیه و با وارونه کردن لوله بر روی دستمال کاغذی، الکل‌های باقیمانده خارج شد. لوله‌ی حاوی رسوب به مدت ۵ دقیقه در حرارت ۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، جهت خشک کردن DNA قرار داده شد. رسوب حاصل در ۱۰۰ میکرولیتر آب دیونیزه‌ی استریل، یا جهت نگهداری طولانی در تریس ۱۰ میلی‌مولار با پی-اچ (pH) ۸ حل گردید. از سلولهای انسانی و موشی هم به طریق فوق DNA استخراج

ساملونلا، گونه‌های شیگلا، گونه‌های پروتئوس، هلیکوباتر پیلوری، ساکارومیسس سرویزیه، گونه‌های آسپرژیلوس، کاندیدا آلیکنس، و هم‌چنین سلولهای انسانی و موشی از جهت آزمون ویژگی پرایمرهای مورد استفاده در PCR، مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفتند.

**نمونه‌های دستگاه تنفس:** در این مطالعه از ناحیه‌ی گلو ۱۰۰ بیمار (۴۳ درصد مرد و ۵۷ درصد زن) با طیف سنی بین ۳ تا ۸۰ سال، که به علت ابتلا به عفونت‌های تنفسی به بیمارستان میلاد و لقمان حکیم تهران مراجعه و یا بستری شده بودند، به‌وسیله سواپ نمونه‌گیری به عمل آمد (۲۲، ۲۸). سواپ‌های گرفته شده به لوله‌های ۱/۵ میلی‌لیتر حاوی محیط‌های انتقال فاقد گلوکز اضافه و سریعاً با استفاده از محیط‌های انتقالی به آزمایشگاه میکروب‌شناسی دانشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه، پس از آماده‌سازی نمونه‌های تنفسی، ابتدا آن‌ها را از فیلتر میلی‌پور ۴۵/۰ میکرون عبور داده و سپس از محلول صاف شده با استفاده از تیپ استریل، همزمان به محیط PPLO-agar حاوی گلوکز و آنتی بیوتیک‌های پنی‌سیلین (۲/۵ واحد در میلی‌لیتر)، آمفوتیریسین B (۵/۰ میکروگرم در میلی‌لیتر)، تلقیح صورت گرفت (۲۹). همه‌ی محیط‌های تلقیح شده در ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد انکوبه گردیدند. پلیت‌ها به مدت سه هفته از روز سوم به بعد از جهت تغییر رنگ و رؤیت کلنبی مورد مطالعه قرار گرفتند. محیط‌هایی که در طی کمتر از ۵ روز به رنگ زرد تغییر یافتدند، به علت امکان آلودگی با غیر مایکوپلاسمها، از مطالعه خارج شدند و چنان‌چه در طی ۵ تا ۱۲ روز تغییر رنگ در محیط‌ها ظاهر می‌گردید، احتمال کشت مثبت مایکوپلاسم افزایش می‌یافت. با استفاده از بزرگ‌نمایی کم میکروسکوب کلنبی‌ها رؤیت می‌گردید.

**استخراج DNA :** مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از نمونه‌ی صاف شده به درون یک لوله‌ی ۱/۵ میلی‌لیتر منتقل و ۵۰ میکرولیتر روغن معدنی استریل روی آن اضافه شد. سپس لوله به مدت ۱۵

سپس، ۴۰ میکرولیتر از مایع رویی رسوب و زیر روغن، به لوله‌ی جدید منتقل گردید. از این DNA در مراحل بعدی به عنوان الگو استفاده شد.

**پرایمر و شرایط PCR :** پرایمرهای مخصوص ژن P1 adhesin مطالعه، پرایمرهای مخصوص ژن P1 مایکوپلاسما پنومونیه (۲۹-۳۱، ۶) است (جدول ۱).

شد. DNA ژنومیک باکتری‌های غیر مایکوپلاسمایی از طریق جوشاندن همراه با دترجنت غیریونی ترایتون ایکس ۱۰۰ (یک هزارم)، بدین طریق به دست آمد. یک کلنی از باکتری مورد نظر را در ۵۰ میکرولیتر از آب دوبار تقطیر استریل دیونیزه حاوی ترایتون ایکس ۱۰۰، سوسپانسیون کرده و ۵۰ میکرولیتر روغن معدنی استریل به آن اضافه شد. سپس به مدت ۱۵ دقیقه در دمای جوش، حرارت داده شد. بعد از سانتریفوژ در ۱۴۰۰ rpm به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفوژ و

جدول ۱. توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثیر DNA مایکوپلاسما پنومونیه.

Sequence(5'-----3')	
P4A	5'AGG CTC AGG TCA ATC TGG CGT GGA 3'
P4B	5'GGA TCA AAC AGA TCG GTG ACT GGG T3'

یافت. چرخه‌های حرارتی شامل یک سیکل دو دقیقه ای ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد، ۴۰ سیکل متوالی (شامل ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه، ۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه و ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه) و یک سیکل پلیمریزاسیون نهایی ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۷ دقیقه بود. محصول PCR با سایز مورد نظر ۳۴۵ جفت باز، در کنار سایز مارکر و کنترل مثبت و منفی، برروی ژل آگاروز ۲ درصد و با استفاده از اتیدیوم بروماید و نور UV بررسی گردید.

**ساخت کنترل مثبت از طریق PCR-Cloning:** عمل کلون کردن قطعه‌ی ۳۴۵ جفت بازی با استفاده از کیت pTZ57R T/A Cloning کمپانی فرمستانس و در وکتور C-medium این کیت، انجام گرفت. محصول PCR مستخرج از ژل مستقیماً برای عمل کلونینگ استفاده شد. با استفاده از محیط این کیت، سلول‌های مستعد سویه‌ی DH5-alfa باکتری اشريشياکلی آماده شد. سپس عمل

تکنیک تشخیصی PCR هم بر روی نمونه‌های اولیه‌ی صاف شده و هم چنین بر روی کلنی‌های رشد یافته بر روی محیط کشت (جهت تأیید کشت) انجام گردید. نمونه‌های کشت، با استفاده از یک سواپ استریل و کشیدن آن به سطح محیط‌های واجد کلنی و انتقال آن به ۲۰۰ میکرولیتر آب دوبار تقطیر استریل و رادیونیزه تهیه، و سپس استخراج DNA به روش جوشاندن انجام گردید. ۵ میکرولیتر از DNA ژنومیک حاصل در مخلوط ۲۵ میکرولیتری PCR، با استفاده از پرایمرهای جلویی و عقبی مخصوص ژن P1 adhesin با غلظت نهایی ۴/۰ میکرومول (یک میکرولیتر از غلظت ده میلی مolar)، ۲/۵ میکرولیتر از بافر PCR (X ۱۰) (سیناژن)، ۱/۵ میلی مolar کلرید منیزیم ( $MgCl_2$ ) (از غلظت ۵۰ میلی مolar (سیناژن)), ۰/۲ میلی مolar مخلوط dNTP (۱۰ میلی مolar (سیناژن)) و با استفاده از ۲ واحد آنزیم (۵ واحد در میکرولیتر) Taq DNA Polymerase (سیناژن) تکثیر

(CFU) مشخص، استخراج DNA از رقت‌ها و انجام آزمون PCR؛ ۲: رقیق‌سازی پلاسمید ۱- pSHA345-1 و انجام PCR بر روی محلول‌های حاوی مقادیر مشخص از پلاسمید. آزمون ویژگی هم با استفاده از تمام میکرووارگانیسم‌های DNA ذکر شده در بخش سویه‌های باکتریایی و همین‌طور سلول‌های یوکاریوت، موش و انسان انجام شد.

**توالی یابی:** توالی DNA در جهت جلویی با استفاده از امکانات تعیین توالی اتوماتیک خاتمه‌دهنده رنگی به روش ختم زنجیره‌ی Dideoxy-Chain Termination انجام گردید.

**روش‌های آماری:** اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ۱۳ تجزیه و تحلیل گردید. آزمون کاپا (Kappa) برای سنجش توافق دو روش کشت و PCR مورد استفاده واقع شد.


### یافته‌ها

جهت بررسی و تأیید ویژگی سنجش PCR مخصوص گونه‌ی مایکوپلاسما پنومونیه، قطعه‌ی ۳۴۵ جفت بازی در پلاسمید pTZ57R و باکتری اشريشیاکلی DH5-alfa کلون و پلاسمیدهای pSHA345-1 و pSHA345-2 ساخته شد (شکل ۱). از این پلاسمید حاوی ژن مورد نظر، به عنوان کترول مثبت (شکل ۱) و همین‌طور جهت تعیین توالی استفاده گردید. مقایسه‌ی توالی حاصل با سکانس‌های موجود از طریق برنامه‌ی BLAST، مطابقت حدود ۱۰۰ درصد را نشان داد. از طریق رقت سازی پلاسمید حاوی ژن، حساسیت تست و به عبارت دیگر حد تشخیص در حد ۱۰ کپی در نمونه‌ی مورد آزمایش به دست آمد. تعیین حساسیت از طریق رقیق‌سازی کشت مایکوپلاسما پنومونیه با واحد سازنده‌ی کلندی مشخص هم انجام شد و نتایج مشابهی به دست آمد (شکل ۱).

Ligation با استفاده از کیت مذکور انجام گرفت. مخلوط لایکیشن به مدت چهار ساعت در دمای اتاق (۲۲ درجه‌ی سانتی‌گراد) انکوبه گردید. بعد طی پروتکل کیت، مرحله‌ی ترانسفورماسیون انجام گردید. کلندی‌های سفید بر روی پلیت حاوی آمپی سیلین (۱۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر) بعلاوه ماده‌ی IPTG و X-Gal انتخاب شدند. کلندی‌های سفید حاوی ژن مورد نظر می‌باشند. سپس به صورت راندوم ۱۰ عدد از کلندی‌های سفید انتخاب گردیده و بر روی پلیت LB agar واجد آمپی‌سیلین کشت خطی داده شد و مجدداً در ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه گردید. پس از این مدت یک یا دو کلندی به لوله‌های ۱/۵ میلی‌لیتر حاوی ۵۰ میکرولیتر آب دیونیزه اضافه کرده و یک قطره روغن معدنی استریل به آن افزوده و به شدت ورتكس گردید. سپس درب لوله‌ها با پارافیلم بسته شد و ۱۵ دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شدند، تا غشای باکتری‌ها پاره و پلاسمید خارج گردد. لوله‌ها به مدت یک دقیقه در میکروسانتریفیوزر با سرعت ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوزر گردیده و سپس از مایع رویی برای PCR استفاده گردید. PCR با مواد و مقادیر ذکر شده قبلی انجام داده شد، و محصول بر روی ژل آگارز ۲ درصد مشاهده گردید. تمامی کلندی‌ها واجد قطعه‌ی مورد نظر بوده، بنابراین دو عدد از آن‌ها به نام ۱-pSHA345-1 و ۲-pSHA345-2 به صورت راندوم انتخاب و با استفاده از روش لیز قلیایی از آن‌ها پلاسمید استخراج و در مرحله‌ی بعد PCR را با استفاده از پلاسمیدهای استخراج شده انجام داده و محصول بر روی ژل آگارز ۲ درصد بررسی گردید. از پلاسمیدهای حاصل به عنوان کترول مثبت و همین‌طور جهت تعیین توالی استفاده شد.

**حساسیت و ویژگی:** جهت بررسی حساسیت جفت پرایمرهای مورد استفاده، از دو روش استفاده شد. ۱: تهیه‌ی رقت از سوسپانسیون مایکوپلاسما پنومونیه با واحد کلندی‌ساز


کلاستریدیوم، انتروکوکوس فکالیس، اشريشیا کلی، گونه‌های سالمونلا، گونه‌های شیگلا، گونه‌های پروتئوس، هلیکوباتر پیلوری، و همین‌طور DNA انسان و موش و یوکاریوت‌های پست مانند ساکارومیسین سرویزیه، گونه‌های آسپرژیلوس، کاندیدا آلبیکنس، دیده نشد.



شکل ۲: الکتروفورز ژل آگارز محصول PCR نمونه‌های بیماران با استفاده از پرایمرهای مخصوص گونه. ستون M: سایز مارکر، ستون ۱: کنترل مثبت، ستون ۲، ۵ و ۷: نمونه‌های بیماران که PCR آن‌ها مثبت شده است، ستون ۳ و ۴ و ۶: نمونه‌های بیماران که PCR آن‌ها منفی شده است، ستون ۸: کنترل منفی (بافر TBE 0.5X).

### بحث

یکی از عواملی که موجب کاهش مورتالیتی، موربیدیتی و نیز کاهش هزینه‌های بیماری‌های عفونی می‌گردد، تشخیص سریع و دقیق می‌باشد. روش‌های سنتی مبتنی بر کشت گرچه در مواردی هنوز به عنوان استاندارد طلایی مطرح است ولی عموماً ویژگی‌های یک روش مطلوب در شناسایی میکروارگانیسم‌ها و از جمله مایکوپلاسمما پنومونیه را ندارند (۷، ۸). در مطالعات مشابه که از تکنیک کشت به همراه روش‌های دیگر مثل روش PCR استفاده شده، نشان داده شده است که تکنیک کشت وقت‌گیر و دارای نتایج منفی کاذب زیادی می‌باشد (۱، ۳۲). در مواردی هم که درمان



شکل ۱: آزمون حساسیت PCR با استفاده از نمونه‌های کلنسی شمارش شده مایکوپلاسمما پنومونیه (CFU مشخص). ستون M: سایز مارکر، ستون ۱: کنترل مثبت، ستون ۲ الی ۷ حاوی نمونه‌های CFU مشخص و به ترتیب ستون ۲ (۳۱۲۵۰ CFU)، ستون ۳ (۳۱۲۵۰ CFU)، ستون ۴ (۱۲۵۰ CFU)، ستون ۵ (۲۵۰ CFU)، ستون ۶ (۶۲۵۰ CFU)، ستون ۷ (۱۰ CFU)، ستون ۸: کنترل منفی (بافر TBE 0.5X).

جهت تشخیص عفونت مایکوپلاسمایی در نمونه‌های تنفسی، از پرایمرهای مخصوص گونه استفاده نمودیم. آزمون PCR مثبت در ۴۳ مورد از ۱۰۰ نمونه‌ی آزمایش شده (۴۳ درصد)، از طریق تکثیر قطعه‌ی صحیح، تشخیص داده شد (شکل ۲). در ۱۰۰ نمونه‌ی مورد آزمایش، ۱۰ مورد کشت مثبت به دست آمد. همه‌ی نمونه‌های کشت مثبت دارای نتیجه PCR مثبت هم بودند. ۳۳ نمونه‌ی دیگر وجود داشت که با روش PCR مثبت بودند ولی نتیجه‌ی کشت آن‌ها منفی بود. در آزمون ویژگی پرایمرهای P4B و P4A، هیچ محصول ناخواسته‌ای (۳۴۵ bp) با DNA باکتری‌های مایکوپلاسمایی غیر از مایکوپلاسمما پنومونیه، و همین‌طور باکتری‌های استافیلولکوکوس اپیدرمایدیس، استرپتوکوکوس پیوژنر، استرپتوکوکوس پنومونیه، باسیلوس سویتیلیس، باسیلوس میکوئیدس، گونه‌های باکتریوم، گونه‌های

تشخیص مایکوپلاسما پنومونیه، توصیه نمی‌شود. از مسائل مهم در تشخیص مولکولی مایکوپلاسما پنومونیه می‌توان به جنبه‌های تکنیکی همچون نحوهٔ جمع‌آوری نمونه، روش انتقال و پردازش نمونه، انتخاب ژن هدف و پروتکل تکثیری، اهمیت کترول کیفی (نتایج منفی و مثبت کاذب) و معترسازی تکنیک (۶) اشاره نمود. نمونه‌هایی که تا به حال در مطالعات مختلف جهت شناسایی مایکوپلاسما پنومونیه مورد استفاده واقع شده عبارتند از: نمونهٔ خلط و لاوّاژ برونکوآلوالار (BAL)، سوآپ گلو و نازوفارنژ، آسپیراسیون نازوفارنژ، آسپیراسیون ترائیال، مایع پلور، آسپیراسیون ترانس توراسیک. در یک مطالعه، نمونه‌های سوآپ نازوفارنژیال و گلو جهت تشخیص مایکوپلاسما پنومونیه مورد مقایسه قرار گرفته و نتیجه‌گیری شده که سوآپ گلو از ارزش تشخیصی بالاتری نسبت به سوآپ نازوفارنژ برخوردار است (۲۸). هندا و همکارانش نیز سه نمونهٔ خلط، Capillary PCR و سوآپ‌های گلو را با تکنیک BAL مقایسه کردند و بالاترین جواب مثبت را با نمونهٔ سوآپ‌های گلو گرفته‌اند (۲۰). در مطالعه‌ی حاضر نیز از سوآپ گلو به عنوان نمونه استفاده شد.

روش‌های مختلف استخراج DNA با یا بدون تیمار نمونه توسط محققین مختلف توضیح داده شده است. برخی از این روش‌های به کار رفته عبارتند از: ۱: رقیق کردن نمونه با سدیم کلراید ۹/۰ درصد، اضافه کردن سدیم دودسیل سولفات (SDS)، استخراج با فنل/کلروفرم و رسوب با استات سدیم و اتانول (۳۳)، ۲: پیش تیمار با پروتئیناز K، اضافه کردن فنل/کلروفرم و رسوب با اتانول (۳۴)، ۳: تیمار با اسپوتازایم (Sputazyme) و هضم با پروتئیناز K (۲۰)، ۴: انکوباسیون با Chelex و سدیم آزاد (۳۵)، ۵: تیمار با سونیکاکسیون (امواج اولتراسوند) و یا جوشاندن (۳۶)، ۶: استخراج با فنل/کلروفرم/ایزوآمیل الکل و سپس استخراج با اتر (۳۷) و ۷: استخراج با فنل/کلروفرم و رسوب به‌وسیله‌ی

آنٹی‌بیوتیکی پیش از نمونه‌گیری انجام شود، نتیجه‌ی کشت منفی گزارش می‌گردد. لذا برای تعیین هویت مایکوپلاسما پنومونیه، روش کشت دارای نتایج ضعیفی بوده و بنابراین کاربرد روش‌های مولکولی همچون PCR در اولویت است. در این مطالعه، روش PCR بر پایه‌ی پرایمرهای مخصوص گونه‌ی مایکوپلاسما پنومونیه و هدف ژنی P1 Cytadhesin طراحی و اجرا شده است. بر این مبنای بررسی توالی پرایمرهای مایکوپلاسما و مقایسه‌ی آنها با توالی‌های دیگر پروکاریوت‌ها، پرایمرهای P4A و P4B انتخاب شدند (۲۹). در این بررسی، مناسب بودن این پرایمرها جهت تشخیص مایکوپلاسما پنومونیه در نمونه‌های بالینی ثابت گردید. شرایط بهینه شده‌ی این مطالعه صرفاً موجب تولید محصول اختصاصی با درجه‌ی بالای از ویژگی و حساسیت و بدون هیچ محصول ناخواسته‌ای بمانند مطالعه‌ی شارما (۲۹)، کادیوکس (۳۰) و تانگ (۳۱) گردید.

اگر چه تعداد نمونه‌ها در این مطالعه زیاد نمی‌باشد ولی با به کار بردن تست PCR، موفق به شناسایی مایکوپلاسما در حدود ۴۳ درصد نمونه‌ها به روش مولکولی، و صرفاً در ۱۰ درصد نمونه‌ها به روش کشت شدیم. این اعداد از لحاظ آماری کاملاً معنی‌دار و دارای اختلاف زیادی می‌باشند. در این بررسی میزان تعداد نمونه‌های PCR مثبت ۴/۳ برابر نتایج کشت بود. در مطالعه وارینگ (۲۲) هم تعداد نمونه‌های PCR مثبت تقریباً ۳/۵ برابر بیشتر از نمونه‌های کشت نشان داده شد. در مطالعه ابل - هورن (۳۲) هم تعداد نمونه‌های PCR مثبت، ۳ برابر نمونه‌های کشت مثبت به دست آمد. در بررسی حاضر هم مشخص شد که PCR حداقل ۴ برابر حساس‌تر از روش کشت می‌باشد. با آزمون کاپا (Kappa) یا اندازه‌گیری توافق، شاخص به دست آمده ۰/۲۵ است. با توجه به این که این عدد کمتر از ۴/۰ می‌باشد بیان گر توافق ضعیف بین روش کشت و PCR است. از این رو عملاً در تصمیم‌گیری‌های بالینی استفاده از روش کشت جهت

CCU) و در برخی دیگر تعداد سلول‌ها مقدار DNA استفاده واقع شده و حدود این واحدها هم متغیر تعريف شده است (۶). بنابراین فقدان یک روش ثابت برای ارزیابی متدهای مختلف به کار رفته، مقایسه بین آنها را مشکل کرده است. درنتیجه، نیاز به یک روش استاندارد و حساس جهت ارزیابی روش‌های مختلف، کاملاً احساس می‌شود. با وجود مراقبتهاز زیاد و فضاسازی مناسب جهت تکنیک‌های تکثیری همچون PCR، باز امکان آلودگی با DNA در سیستم تشخیص مولکولی وجود دارد که درنتیجه باعث پاسخ مثبت کاذب می‌گردد. بنابراین کاربست کترل‌های مناسب (کترل مثبت، منفی و یا نوعاً کترول درونی) در مراحل مختلف استخراج DNA، تکثیر و مرحله‌ی تشخیص، کمک شایانی به کاهش آلودگی و نشان دادن آن می‌نماید (۷، ۸).

مقایسه‌های بین لبراتواری نیازمند کترول کیفی در تکنیک‌های تکثیر اسیدنوکلئیک در شرایط آزمایشگاه می‌باشد. هدف مطالعه‌ی اورسی (۳۹) در سال ۲۰۰۳، ارزیابی کارآیی چهار سنجش متفاوت در شناسایی مایکوپلاسمای پنومونیه بهوسیله‌ی PCR در سه لبراتوار از طریق بررسی استخراجی از نمونه‌های تنفسی بود. نتایج مثبت کاذب PCR در همه‌ی سه لبراتوار شرکت کننده در این مطالعه، ثبت گردید. در مطالعه دیگری که بهوسیله یون (۳۸) انجام شد آلودگی و نتایج مثبت کاذب به تکرار مشاهده گردید. این آلودگی‌ها عمدتاً ناشی از نمونه‌های بهشدت مثبت و همین‌طور نمونه‌های PCR مثبت قبلی بوده است. ابل - هورن (۳۲) به کارگیری تکنیک Nested-PCR را همراه با افزایش حساسیت و ویژگی و همین‌طور ریسک بیشتر آلودگی دانست. برای حل مشکل آلودگی، فضاسازی مناسب امری ضروری است که باعث کاهش نتایج مثبت کاذب می‌گردد. در این بررسی سعی شد با فضاسازی مناسب و به کارگیری تجهیزات مقتضی هر بخش،

استات سدیم یا سدیم کلراید (۱۶). در مطالعه‌ی حاضر از روش جوشاندن ساده در مورد نمونه‌های بالینی با نتایج مطلوب استفاده گردید. روش‌های استخراج با استفاده از کیت‌های تجاری توسط محققینی مانند گنارپ (۲۸)، تانگ (۳۱) و گروندھال (۳۳) استفاده شده است. مطالعاتی که در آن، به مقایسه‌ی روش‌های مختلف استخراج DNA مایکوپلاسمای پنومونیه در تشخیص مولکولی پرداخته‌اند نادر است (۳۲). بر اساس نتایج ابل - هورن، تکنیک استخراج DNA با فل/اکلروفرم مستلزم صرف زمان زیاد و کاهش حساسیت است و همین‌طور بر اساس نتایج حاصله اثر تحقیق یون (۳۸)، روش یخ زدن/جوشاندن جهت تهیه‌ی DNA مایکوپلاسمای پنومونیه پیشنهاد گردیده است.

بخش‌های مختلفی از ژنوم مایکوپلاسمای پنومونیه مانند ژن P1 Adhesin ۱۶ S rRNA (۹، ۱۶، ۱۹)، ژن tRNA ۳۹-۴۱ (۲۳)، ژن tuf (۲۳)، ژن tuf (۲۳)، ژن Cytadhesin (۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۹، ۳۱، ۳۶)، ژن P1 Adhesin ۱۶ S rRNA (۳۸)، پرایمرهای ژن P1 Adhesin ۱۶ S rRNA (۳۸) ارزیابی شده است که حساس‌تر از پرایمرهای شاید علت این امر وجود کپی‌های متعدد ژن P1 باشد. در این مطالعه هم بهدلیل ویژه بودن و همین‌طور توالی ثابت ژن P1، از آن به عنوان هدف تکثیر استفاده گردید. مقایسه‌ی روش‌های مختلف PCR بهدلایل: ۱: اختلاف در جمع آوری نمونه، ۲: در روش‌های استخراج، ۳: حجم نمونه، ۴: ژن هدف، ۵: پرایمر، ۶: پارامترهای سیکل حرارتی، ۷: روش شناسایی، و ۸: اختلاف در انتقال نمونه‌ها، دارای مشکلات خاص خود می‌باشد. به علاوه، اختلافات زیادی در واحدهای به کار رفته در اندازه‌گیری حدود حساسیت روش‌ها، به چشم می‌خورد. به این معنی که در برخی مطالعات، واحد سازنده‌ی کلنی (CFU)، در (Color Changing Units- برخی واحد تغییر رنگ-

ریسک آلودگی و خصوصاً مثبت‌های کاذب را با توجه به  
کنترل‌های مثبت و منفی به صفر نزدیک کنیم.

### تقدیر و تشکر

از خانم فاطمه اخلاقی، دکتر محسن لطفی و خانم سهیلا مرادی از موسسه رازی بخش مدیریت کنترل کیفی و میکروب‌شناسی برای در اختیار گذاشتن سوش‌های مایکوپلاسمما، آقای دکتر کورش کمالی جهت مشاوره‌های آماری (دستیار تخصصی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران)، از دکتر سیرروس زینلی (معاون پژوهشی پاستور) جهت مشاوره و کمک‌های علمی، دکتر شکرا... محمدی محمودآبادی (بیمارستان میلاد) جهت تهیه نمونه و آقای سید مهدی تهرانی جهت تایپ و امور کامپیوتر تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

### نتیجه گیری

به‌طورکلی می‌توان گفت روش‌های کلاسیک تشخیصی، به‌دلایل محدودیت‌های ذاتی (صرف وقت زیاد، حساسیت کم، نیاز به مهارت و تجربه زیاد و همین‌طور مراحل دشوار و پرز Hampton) فاقد معیارهای یک روش ایده‌آل جهت شناسایی مایکوپلاسمما پنومونیه است. ولی روش‌های مولکولی هم‌چون روش‌های تکثیر اسیدنوکلئیک در شرایط آزمایشگاه، به دلیل پتانسیل بالقوه و بالفعل، کاربرد فراوانی در تشخیص عواملی هم‌چون مایکوپلاسمها دارند. نتایج این مطالعه به‌طور روشنی دلالت بر این نکته دارد که سنجش PCR بر مبنای سکانس‌های ژن P1 یک تکنیک ارزشمند و قابل اعتماد جهت شناسایی مایکوپلاسمما پنومونیه در بیماری‌های تنفسی است.

### منابع

- 1- Waiters KB, Talkington DF. Mycoplasma pneumoniae and its role as a human pathogen. *Clin Microbiol Rev.* 2004; 17(4): 697- 728.
- 2- Clyde W, Jr A. Clinical overview of typical Mycoplasma pneumoniae infections. *Clin Infect Dis.* 1993; 17(supple.1): S32- S6.
- 3- Jacobs E. Mycoplasma infections of the human respiratory tract. *Wien Klin Wochenschr.* 1997; 109: 574- 7.
- 4- Layani-Milon MP, Gras I, Valette M, Luciani J, Stagnara J, Aymard M. Incidence of upper respiratory tract Mycoplasma pneumoniae infections among outpatients in Rhone-Alpes, France, during five successive winter periods. *J Clin Microbiol.* 1999; 37: 1721- 6.
- 5- McMillan JA. Mycoplasma pneumoniae infection in pediatrics. *Semin Pediatr Infect Dis.* 1998; 9: 112- 9.
- 6- loens K, Uris D, Goossens H, Ieven M. Molecular diagnosis of Mycoplasma pneumoniae respiratory tract infections. *J Clin Microbiol.* 2003; 41: 4915- 23.

- ۷- شاه حسینی محمد حسن. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز. چاپ اول. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۴، صفحات ۱-۲۵.
- ۸- شاه حسینی محمد حسن. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز. چاپ اول. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۴، صفحات ۹۳-۱۰۱.
- 9- Van-kuppeveld FJ, Van-der-logt JT, Angulo AF, et al. Genus- and species-specific identification of Mycoplasmas by 16S rRNA amplification. *Appl Environ Microbiol.* 1992; 58: 2606- 15.
- 10- Yamazaki T, Narita M, Sasaki N, Kenri T, Arakawa Y, Sasaki T. Comparison of PCR for sputum samples obtained by induced cough and serological tests for diagnosis of *Mycoplasma pneumoniae* infection in children. *Clin Vac Immunol.* 2006; 13(6): 708-10.
- 11- Pitcher D, Chalker VJ, Sheppard C, George RC, Harrison TG. Real-time detection of *Mycoplasma pneumoniae* in respiratory samples with an internal processing control. *J Med Microbiol.* 2006; 55: 149-55.
- 12- Dumke R, Luck PC, Noppen C, Schaefer C, Baum HV, Marre R, Jacobs E. Culture-independent molecular subtyping of *Mycoplasma pneumoniae* in clinical samples. *J Clin Microbiol.* 2006; 44(7): 2567-70.
- 13- Morozumi M, Nakayama E, Iwata S, Aoki Y, Hasegawa K, Kobayashi R. Simultaneous detection of pathogens in clinical samples from patients with community-acquired pneumonia by real-time PCR with pathogen specific molecular beacon probes. *J Clin Microbiol.* 2006; 44(4): 1440-6.
- 14- Beersma MFC, Dirven K, Dam AP, Templeton KE, Claas ECJ, Goossens H. Evaluation of 12 commercial tests and the complement fixation test for *Mycoplasma pneumoniae*-specific immunoglobulin G(IgG) and IgM antibodies, with PCR used as the gold standard. *J Clin Microbiol.* 2005; 43(5): 2277-85.
- 15- Shuvy M, Rav-Acha M, Izhar U, Ron M, Nir-Paz R. Massive empyema caused by *Mycoplasma pneumoniae* in an adult; a case report. *BMC Infect Dis.* 2006; 6(18): 1- 4.
- 16- Falguera M, Nogues A, Ruiz-Gonzales A, Garcia M, Puig T. Detection of *Mycoplasma pneumoniae* by Polymerase chain reaction in lung aspirates from patients with community-acquired pneumonia. *Chest.* 1996; 110: 972- 6.
- 17- Khanna M, Fan J, Pehler-Harrington K, Waters C, Douglass P. The pneumoplex assays, a multiplex PCR-enzyme hybridization assay that allows simultaneous detection of five organisms, *Mycoplasma pneumonia*, *Chlamydia(Chlamydophila) pneumoniae*, *Legionella pneumophila*, *legionella micdadei*, and *Bordetella pertussis*, and its real-time counterpart. *J Clin Microbiol.* 2005; 43(2): 565- 71.
- 18- Ginevra C, Barranger C, Ros A, et al. Development and evaluation of Chlamylege, a new commercial test allowing simultaneous detection and identification of *Legionella*, *Chlamydophila pneumoniae*, and *Mycoplasma pneumoniae* in clinical respiratory specimens by multiplex PCR. *J Clin Microbiol.* 2005; 43(7): 3247-54.

- 19- Loens K, Ursi D, Ieven M, et al. Detection of *Mycoplasma pneumoniae* in spiked clinical samples by nucleic acid sequence based amplification. *J Clin Microbiol.* 2002; 40: 1339-45.
- 20- Honda J, Yano T, Kusaba M, et al. Clinical use of capillary PCR to diagnosis *Mycoplasma pneumoniae*. *J Clin Microbiol.* 2000; 38: 1382- 4.
- 21- Welti M, Jaton K, Altwegg M, Sahli R, Wenger A, Bille J. Development of a multiplex real time quantitative PCR assay to detect *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella pneumophila* and *Mycoplasma pneumoniae* in respiratory tract specimens. *Diagn Microbiol Infect Dis.* 2003; 45: 85-95.
- 22- Waring AL, Halse TA, Csiza CK, Carolyn CJ, Arruda-Musser K, Limburger RJ. Development of a genomic-based PCR assay for detection of *Mycoplasma pneumoniae* in a large outbreak in New York state. *J Clin Microbiol* 2001. 39: 1385- 90.
- 23- Nour M, Trabelsi A, Maatouk N, Hammami M. Amplification of P1 and 16S rRNA genes by nested PCR for detection of *Mycoplasma pneumoniae* in paediatric patients. *Pathol Biol.* 2005; 53: 9- 14.
- 24- Miyashita N, Saito A, Kohno S, et al. Multiplex PCR for the simultaneous detection of *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae* and *Legionella pneumoniae* in community-acquired pneumonia. CAP Study Group. *Respir Med.* 2004; 98: 542- 50.
- 25- Luneberg E, Jensen JS, Frosch M. Detection of *Mycoplasma pneumoniae* by polymerase chain reaction and nonradioactive hybridization in microtitre plate. *J Clin Microbiol.* 1993; 31: 1088-94.
- 26- Svenstrup HF, Nielsen PK, Drasbek M, Birkelund S, Christiansen G. Adhesin and inhibition assay of *Mycoplasma genitalium* and *M. pneumoniae* by immunofluorescence microscopy. *J Med Microbiol.* 2002; 51: 361- 73.
- 27- Su CJ, Tryon VV, Baseman JB. Cloning and sequence analysis of cytadhesin P1 gene from *Mycoplasma pneumoniae*. *Infect Immun.* 1987; 55: 3023-3029.
- 28- Gnarp J, Lunback A, Sundelof B. Comparison of nasopharyngeal and throat swabs for the detection of *Chlamydia pneumoniae* and *Mycoplasma pneumoniae* by polymerase chain reaction. *Scan J Infect Dis.* 1997; Suppl 104: 11-12.
- 29- Sharma S, Brousseau R, Kasatiya S. Detection and confirmation of *Mycoplasma pneumoniae* in urogenital specimens by PCR. *J Clin Microbiol.* 1998; 36(1): 277-80.
- 30- Cadieux N, Lebek P, Brousseau R. Use of triplex polymerase chain reaction for the detection and differentiation of *Mycoplasma pneumoniae* and *Mycoplasma genitalium* in the presence of human DNA. *J Gen Microbiol.* 1993; 139: 2431-7.
- 31- Tong CYW, Donnelly C, Harvey G, Stillis M. Multiplex polymerase chain reaction for the simultaneous detection of *Mycoplasma pneumoniae* and *Chlamydia psittaci* in respiratory samples. *J Clin Pathol.* 1999; 52: 257-63.

- 32- Abele-Horn M, Busch U, Nitschko H, et al. Molecular approaches to diagnosis of pulmonary diseases due to *Mycoplasma pneumoniae*. *J Clin Microbiol.* 1998; 36: 548-51.
- 33- Grondhal B, Puppe W, Kuhne I, Weigl JA, Schmitt HJ. Rapid identification of nine microorganisms causing acute respiratory tract infections by single tube multiplex reverse transcription PCR: feasibility study. *J Clin Microbiol.* 1999; 37: 1-7.
- 34- Corsaro D, Valassina M, Venditti D, Venard V, Le Faou A, Valensin PE. Multiplex PCR for rapid and differential diagnosis of *Mycoplasma pneumoniae* and *Chlamydia pneumoniae* in respiratory infections. *Diagn Microbiol Infect Dis.* 1999; 35: 105-8.
- 35- Kessler HH, Dodge DE, Pierer K, et al. Rapid detection of *Mycoplasma pneumoniae* by an assay based on PCR and probe hybridization in a nonradioactive microwell plate format. *J Clin Microbiol.* 1997; 35: 1592-94.
- 36- Buck GE, OHara LC, Summersgill JT. Rapid, sensitive detection of *Mycoplasma pneumoniae* in simulated clinical specimens by DNA amplification. *J Clin Microbiol.* 1992; 30: 3280- 3.
- 37- Waries ME, Toikka P, Saarinen T, et al. Diagnosis of *Mycoplasma pneumoniae* pneumonia in children. *J Clin Microbiol.* 1998; 36: 3155- 9.
- 38- Ieven M, Ursi D, Van Bever H, Quint W, Niesters HG, Goossens H. Detection of *Mycoplasma pneumoniae* by two polymerase chain reactions and role of *M.pneumoniae* in acute respiratory tract infections in pediatric patients. *J Infect Dis.* 1996; 173: 1445- 52.
- 39- Ursi D, Ieven M, Noordhoek GT, Ritzler M, Zandlevan H, Altweig M. An interlaboratory comparison for the detection of *Mycoplasma pneumoniae* in respiratory samples by the polymerase chain reaction. *J Microbiol Methods.* 2003; 53: 289-94.
- 40- Leng Z, Kenny GE, Roberts MC. Evaluation of the detection limits of PCR for identification of *Mycoplasma pneumoniae* in clinical samples. *Mol Cell Probes.* 1994; 8: 125-30.
- 41- De Barbeyrac B, Bernet-Poggi C, Febrer F, Renaudin H, Dupon M, Bebear C. Detection of *Mycoplasma pneumoniae* and *mycoplasma genitalium* in clinical samples by polymerase chain reaction. *Clin Infect Dis.* 1993; 17(Suppl. 1): S83- 9.