

## معرفی یک مورد بیمار مبتلا به کیست هیداتیک اولیه‌ی ران

دکتر رامین فرزام<sup>۱</sup>، دکتر عبدالمجید قائم پناه<sup>۲</sup>، دکتر عبد‌الامیر فیضی<sup>۳</sup>

نوسنده‌ی مسئول: زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله موسوی raminfarzam2007@yahoo.com

دریافت: ۸۸/۹/۸ پذیرش: ۸۸/۱۲/۳

### چکیده

هر ارگانی می‌تواند توسط بیماری هیداتیک درگیر شود. کبد و ریه شایع‌ترین اعضاء و عضلات به دلیل اسید‌لکتیک بالا و قابلیت انقباض از اعضای نادر هنگام درگیری هستند. در سال ۱۳۸۸، دختر روستایی ۲۲ ساله ساکن روستایی در اطراف زنجان، به دلیل احساس توده در داخل ران راست از ۳ سال پیش مراجعت نمود. در بررسی انجام شده، شرح حال، سابقه‌ی فامیلی، آزمایش خون و سروولوژی از لحاظ درگیری کیست هیداتیک منفی بود. MRI تشخیص حین جراحی و نهایتاً بررسی آسیب شناسی تشخیص را مسجل ساخت. به منظور پیشگیری از پاره شدن کیست و ابتلای اعضای مجاور و ایجاد آنافیلاکسی حین جراحی، کیست هیداتیک باید در تشخیص افتراقی توده‌های اندامها بهخصوص در مناطق آنالوگیک قرار می‌گرفت.

واژگان کلیدی: کیست هیداتیک، ران، ام‌آرآی.

### مقدمه

مخاط روده را سوراخ کرده، وارد جریان خون می‌شوند. انکوسفر سپس در احسای میزان جایگزین شده، به صورت کیست لاروی بالغ درمی‌آید. کبد و ریه شایع‌ترین ارگان‌های درگیر هستند ولی کیست‌ها پس از عبور از سد این دو ارگان می‌توانند در هر عضوی مانند: مغز، قلب، استخوان‌ها و عضلات جایگزین شوند، (۱). گزارش زیر مورد نادری از درگیری عضله‌ی ران توسط کیست هیداتیک است.

#### گزارش مورد

بیمار دختری است ۲۲ ساله، ساکن یکی از روستاهای اطراف زنجان که در مردادماه سال ۱۳۸۸ به دلیل احساس

اکینوکوکوزیس دو فرم دارد. هیداتید یا بیماری کیستی تک‌حفره‌ای که توسط اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می‌شود و فرم دوم، بیماری کیستی الولار که توسط اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس ایجاد می‌گردد. گوسفند، بز، شتر و اسب میزان مناسب برای انگل بوده و از آنجایی که انگل توسط سگان اهلی منتقل می‌گردد، بیماری هیداتید در سراسر جهان گسترش دارد. انسان از طریق خوردن تخم انگل قابل حیات در غذا مبتلا می‌شود. تخم انگل از طریق مدفع سگ آلوده به کرم نواری در محیط پخش می‌شود. تخم‌ها پس از راهیابی به مجرای روده به صورت انکوسفر در آمدند.


۱- متخصص ارتوپدی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۲- متخصص پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۳- متخصص پاتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

بوده ولی در خانه از سگ اهلی نگهداری نمی‌کردند. در بررسی با MRI، توده‌ای به ابعاد  $5^*5^*10^*$  سانتی‌متر مکعب، high signal در  $T_1$  و low signal در  $T_2$  است. در داخل عضله‌ی واستوس مدیالیس با حاشیه‌ی مشخص و بدون تهاجم به منطقه‌ی دیگر وجود داشت. در تشخیص مطرح شده در MRI، لیپوم رد شد ولی بررسی از لحاظ سایر موارد ضایعات فضای گیر توصیه شده بود.

توده در سمت داخل ران راست از ۳ سال پیش مراجعت نموده است. توده‌ی مذکور به ابعاد  $5^*5^*10^*$  سانتی‌متر مکعب، غیر متحرک، غیر حساس و سفت بوده، در سه سال گذشته رشد تدریجی داشته است. علایم حیاتی و حال عمومی طبیعی بوده، هیچ علامت و نشانه‌ی بیماری چه در شرح حال و چه در معاینه سایر ارگان‌ها یافت نشد. بیماری یا توده‌ی مشابه در سایر افراد خانواده وجود نداشت. شغل پدر خانواده دامداری



تصویر ۳


تصویر ۲

تصویر ۱

تصویر ۱ و ۲. مقاطع کرونال از توده‌ی مذکور به روش MRI و تصویر ۳. مقاطع آگزیال از توده مذکور به روش MRI.

محدوه نرمال بودند. بیمار با اطلاعات فوق جهت بررسی به اطاق عمل برده شد.

آزمایش شمارش خون طبیعی بسود و ائزوینوفیلی وجود نداشت ESR و CRP در



تصویر ۶

تصویر ۵

تصویر ۴

تصویر ۴. نمای میکروسکوپیک از توده‌ی مذکور شامل غلاف کیست و لایه‌ی ژرمینال، تصویر ۵. نمای میکروسکوپیک از توده‌ی مذکور شامل سلول‌های عضلانی و غلاف کیست، تصویر ۶. نمای ماکروسکوپیک از توده‌ی مذکور شامل غلاف کیست و لایه‌ی ژرمینال.

پرهیز از آسپیراسیون کیست و مراقبت حین جراحی اهمیت دارد زیرا پاره شدن کیست می‌تواند واکنش آنافلاکتیک ایجاد نموده، باعث آزاد شدن کیست‌های دختر و ابتلای نسوج دیگر شود. در شرح حال، ابتلای سایر افراد خانواده مانند وجود کیست در کبد یا ریه کمک‌کننده است که در این بیمار وجود نداشت. روستایی بودن و داشتن سگ باید مورد توجه قرار گیرد که در بیمار ما با وجود روستایی بودن از سگ اهلی نگهداری نمی‌شد. در بررسی آزمایشگاهی، بررسی سروولوژیک IgG کمک‌کننده بوده، ولی حساسیت آن در درگیری کبدی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، در ریه ۵۰ تا ۵۶ درصد و در درگیری سایر ارگان‌ها ۲۵ تا ۵۶ درصد است (۱). در مورد حاضر تست سروولوژیک منفی بود.

در تصاویر MRI مایع کیست هیداتیک در نمای  $T_1$  ایزویا هیپواینتنس و در نمای  $T_2$  هیپراینتنس بود. در صورت وجود کیست‌های دختر، کیست مادر در نمای  $T_2$  سیگنال بالاتری را نشان می‌دهد. بافت فیبروزی دور کیست خود را به صورت یک حاشیه‌ی Low Signal در نمای  $T_1$  و  $T_2$  نمایان ساخت (علامت حاشیه‌ی Rim Sign). (۷).

### نتیجه‌گیری

بیماری کیست هیداتیک باید در تشخیص افتراقی توده‌های عضلانی به خصوص در بیماران روستایی کشورمان در نظر گرفته شد.

در حین جراحی پوست و زیر پوست، فاسیا و عضله‌ی استوس مدیالیس باز و کیستی با مایع شفاف بدون تهاجم به اطراف نمایان شد. توده خارج و جهت بررسی پاتولوژیک فرستاده شد. با توجه به ظاهر کیست، تشخیص کیست هیداتیک مطرح و احتیاط لازم جهت عدم پاره شدن کیست و ابتلای نسوج مجاور صورت گرفت. بعد از عمل قرص البندازول با دوز ۴۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز به مدت یک‌ماه تجویز شد. سروولوژی کیست هیداتیک، سونوگرافی کبد و رادیوگرافی قفسه‌ی صدری درخواست شد که از لحاظ درگیری با کیست هیداتیک منفی بودند. در بررسی پاتولوژیک به عمل آمده تشخیص کیست هیداتیک تایید شد.

### بحث

۵۰ الی ۷۰ درصد از کیست‌های هیداتید در کبد، ۲۰ الی ۳۰ درصد در ریه و ۱۰ درصد در سایر ارگان‌ها یافت می‌شوند. به لحاظ تئوری عضلات به دلیل انقباض و لاکتیک اسید بالا محل مناسبی جهت میزانی کیست هیداتید به شمار نمی‌روند (۲). گزارشات محدودی از درگیری عضله توسط کیست هیداتید مانند قسمت داخلی ران وجود دارد. در یک بررسی انجام شده از ۲۷۲ مورد کیست هیداتیک، ران تنها در ۳۷ / ۰ درصد موارد درگیر شده بود (۳). با برآم و سیرکسی کیست هیداتیک اولیه‌ی عضلات ساعد (۴)، مرتضوی و همکاران کیست هیداتیک اولیه‌ی ران (۵) و ابواشی مورد مشابه را گزارش نموده‌اند (۶). تشخیص قبل از عمل به دلیل

### References

- King CH, Cestodes (tape worms). In: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, eds. Principles and practice of infectious disease. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone Inc; 2005: 3290-3.

- 2- Garcia-diez Al, Ros Mendoza LH, Villacampa VM, Cozar M, Fuertes MI. MRI evaluation of soft tissue hydatid disease. *Eur Radiol*. 2000; 10: 462-6.
- 3- Sfioleas M, Misiakos EP, Kakisis J, Lambrou

- P, Tsinari KK, Skalkeas G. Surgical treatment of human echinococcosis. *Int Surg.* 2000; 85: 358-65.
- 4- Bayram M, Sirkci A. Hydatid cyst located intermuscular area of the forearm: MR imaging findings. *Eur J Radiol.* 2000; 36: 130-2.
- 5- Mortazavi J, Motamed M, Asadollahi S, Haeri H, Moghtadaee M. Primary intermuscular hydatid cyst of the thigh. *orthopedics.* 2008; 31: 85.
- 6- Abu-Eshy S. Some rare presentation of hydatid cyst. *J R Coll Surg.* 1998; 43: 347-52.
- 7- Slovis T, Caffey S. pediatric diagnostic imaging. Philadelphia: Mosby; 2008.

## ***Intramuscular Hydatid Cyst of the Thigh: A Case Presentation***

**Farzam R<sup>1</sup>, Ghaempanah A<sup>2</sup>, Feizy A<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Dept. of Orthopedics, Ayatollah Mosavi Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

<sup>2</sup>Dept. of Pathology, Ayatollah Mosavi Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

<sup>3</sup>Dept. of Pathology, Valieasr Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

**Corresponding Author:** Farzam R, Dept. of Orthopedics, Ayatollah Mosavi Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.

**Email:** Raminfarzam2007@yahoo.com

**Received:** 29 Nov 2009    **Accepted:** 22 Feb 2010

Every organ can be involved by hydatid disease. Liver and lung are the most common sites but muscles, due to high level of lactic acid and contractility, are among the rare areas involved by hydatid cysts.

In 2009, a 23 year old Zanjanian villager girl came to clinic because of having a mass at her right thigh from 3 years ago. Present and past medical history, blood count and serologic evaluation was negative for hydatosis, but MRI, diagnosis during the operation and eventually pathologic evaluation confirmed the diagnosis of hydatid cyst.

Hydatid disease should be considered in differential diagnosis of masses, involving the limbs, especially at endemic areas in order to prevent rupture of the cyst during operation which can cause anaphilaxis and involvement of other tissues.

**Keywords:** *Hydatid cyst, Thigh, MRI*