

## تشخیص موتاسیون در کدون ۳۱۵ ژن *katG* مارکر مقاومت به ایزونیازید در سوش‌های مايكوباكتريوم توبركولوزيس جدا شده از بيماران اصفهان و تهران با روش PCR-RFLP

دکتر پرویز مهاجری<sup>۱</sup>، دکتر اکبر توکلی<sup>۲</sup>، دکتر شراره مقیم<sup>۳</sup>

نويسنده‌ی مسئول: کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی، گروه ميكروب‌شناسي p\_mohajeri@yahoo.com

پذيرش: ۸۷/۸/۲۷ دريافت: ۸۷/۸/۹

### چكيده

**زمينه و هدف:** مقاومت داروبيي سل، پيوسته در حال افزایش است و با توجه به محلود بودن داروهای موثر، وجود اين مقاومت‌ها به عنوان تهدیدي در برنامه‌ی كنترل سل محسوب می‌شود. ايزونيازيد به عنوان موثرترین دارو در از بين بردن باسيل‌های سل شناخته شده است که مقاومت به آن نيز براحتی ايجاد می‌شود. در اين بين، موتاسیون‌های *katG* مخصوصاً جانشيني *S315T* عامل مقاومت به ايزونيازيد در اكثرب موارد سل است. تواتر اين جانشيني در جمعیت‌های مختلف متفاوت است. مطالعه‌ی حاضر مشخصه‌های مولکولی مقاومت به ايزونيازيد را در سویه‌های باسيل سل نشان می‌دهد که از آن می‌توان به عنوان ابزار سريع تشخيصي مقاومت استفاده نمود.

**روش بررسی:** با استفاده از روش نسبی ۱ درصد، حساسیت ۱۲۶ سویه‌ی مايكوباكتريوم توبركولوزيس جدا شده از بيماران شهرهای اصفهان و تهران نسبت به ايزونيازيد تعیین شد. نوع موتاسیون در کدون ۳۱۵ ژن *katG* در سویه‌های مقاوم به ايزونيازيد با استفاده از روش PCR-RFLP مشخص گردید. بدين منظور مخصوص *PCR* به سيله‌ی آنزيم *MspI* بررش داده شد. يافته‌ها: از ۱۲۶ مايكوباكتريوم توبركولوزيس جدا شده، ۳۲ سویه (۲۵/۴ درصد) مقاوم به ايزونيازيد بود. ميزان اين مقاومت در نمونه‌های اصفهان ۲۲/۶ درصد (۱۹ سویه) و در نمونه‌های تهران ۳۱ درصد (۱۳ سویه) بود. در كل، ۷۲ درصد از انواع جدا شده‌ی مقاوم به ايزونيازيد با استفاده از آناليز لوكوس *katG 315* قابل تشخيص بود.

**نتيجه‌گيری:** *PCR-RFLP* با *MspI* بيشتر سویه‌های مقاوم ايزونيازيد (۷۲ درصد) را که داري موتاسیون در کدون ۳۱۵ ژن *katG* بودند مشخص نمود. توجه به جنبه‌های مولکولی سویه‌های مقاوم به ايزونيازيد منجر به ارائه ابزارهای ژنتيكي مختلف برای تشخيص سريع مقاومت به ايزونيازيد در انواع جدا شده‌ی كلينيكي می‌شود.

**وازگان کلیدی:** مايكوباكتريوم توبركولوزيس، ايزونيازيد، *katG*, *PCR-RFLP*، اصفهان، تهران

۱- دکتراي باكتري شناسی پزشكی، استاديار دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه

۲- دکتراي ميكروب‌شناسي، استاد دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

۳- دکتراي ویروس‌شناسی، استاديار دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

## مقدمه

از باسیل‌های سل کشت داده شده از بیماران ایرانی، MDR هستند (۸). مقاومت دارویی در یک جمعیت باکتریایی بزرگ باسیل سل در پی موتاسیون‌های خودبخودی تک مرحله‌ای و اتفاقی روی می‌دهد. احتمال بروز موتاسیون‌های مرتبط با مقاومت دارویی برای ریفامپین<sup>۷</sup> ۱۰<sup>-۷</sup> است در حالی که این مقدار در خصوص ایزونیازید و برخی از داروهای مرسوم ضد سلی<sup>-۶</sup> است (۹). بررسی خصوصیات مولکولی سویه‌های باسیل سل مقاوم به داروی متعلق به نواحی جغرافیایی مختلف، اطلاعات مفیدی برای ارایه‌ی روش‌های مولکولی بهتر تشخیص مقاومت دارویی فراهم می‌آورد (۱۰). آنژیم katG باسیل سل هم به عنوان یک آنژیم کاتالاز باعث حذف پراکسید هیدروژن شده و هم به عنوان یک آنژیم پراکساید می‌تواند ایزونیازید را اکسید کرده و به فرم فعال درآورده تا بتواند اثر ضد سلی داشته باشد (۱۱).

مقاومت مایکوباكتریوم توبرکولوزیس به ایزونیازید ممکن است به واسطه‌ی انواع مختلفی از موتاسیون‌هایی روی InhA katG دهد که حداقل در سه ژن مختلف kasA (کد کنندگی پروتئین انوئیل اسیل کاربر ردکتاز) و (کد کنندگی β-کتواسیل ACP ستتاژ) و ناحیه‌ی بین ژنی katG oxyR- ahpC پدید می‌آیند. موتاسیون‌هایی که در S315T اتفاق می‌افتد مخصوصاً جانشینی مسئول بروز اکثر موارد مقاومت به ایزونیازید محسوب می‌شود. گرچه، فراوانی جانشینی katG در جمعیت‌های مختلف، یکسان نیست (۱۲). برخی از این موتاسیون‌ها باعث بروز تغییرات کونفورماتیوی در katG می‌شوند و برخی نیز از اتصال ایزونیازید جلوگیری می‌کنند (۱۳). به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد تغییر S315T که در محل اتصال ایزونیازید بروی katG روی می‌دهد عامل بخش عمدات از شکست‌های درمانی سل باشد. هدف از مطالعه‌ی ما، تعیین فراوانی موتاسیون S315T ژن katG انواع جدا شده باسیل سل مقاوم به ایزونیازید جدا شده در اصفهان و تهران بود.

سالیانه، سل موجب مرگ حدود ۲ میلیون نفر در دنیا می‌شود و اکثر این موارد در کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده اتفاق می‌افتد. سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است که بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰، نزدیک به یک بیلیون فرد دیگر به سل آلوه خواهند شد و از این میان ۲۰۰ میلیون نفر به بیماری مبتلا شده و ۳۵ میلیون نفر نیز بر اثر بیماری سل جان خود را از دست خواهند داد (۲و۱). علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در درمان و مهار بیماری سل حاصل شده، هنوز هم این بیماری به عنوان یکی از مشکلات عملدهی بهداشتی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه باقی است (۳). در حال حاضر ایزونیازید و ریفامپین در کنار هم شالوده‌ی درمان شیمیائی کوتاه مدت عفزت‌های مایکوباكتریوم توبرکولوزیس را تشکیل می‌دهند (۵و۴). مشاهدات پیشین حاکی از آن است که باسیل‌های سل، در مجاورت با ایزونیازید خاصیت مقاومت به رنگبری با اسید را از دست داده، از بین می‌روند. بدین ترتیب محققین حدس می‌زنند که این دارو باعث تغییر در ترکیب لیپیدی دیواره‌ی سلولی شود (۶). تشخیص مایکوباكتریوم توبرکولوزیس و نیز تعیین الگوی حساسیت دارویی آن ارزش فراوانی در بکارگیری روش‌های درمانی موثر و نیز کنترل جهانی سل دارد (۷). ظهور سویه‌های مقاوم دارویی مایکوباكتریوم توبرکولوزیس، مانع بزرگی را در مسیر درمان و کنترل بیماری ایجاد نموده است. رویداد سل مقاوم به دارو در نقاط مختلف جغرافیایی یکسان نیست. فراوانی سویه‌های (سویه‌های مایکوباكتریوم توبرکولوزیس با مقاومت MDR توان به ایزونیازید و ریفامپین) سالهاست که در حال افزایش است و تاکنون چندین مورد از شیوع آنها گزارش شده است. استونی، ایران، چین، هند و برخی نواحی روسیه به عنوان اندیک ترین نواحی وجود مقاومت دارویی معرفی شده است. مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که نزدیک ۵ درصد

نیز به عنوان سویه‌ی شاهد و استاندارد که به تمام داروهای ضد سلی حساس است استفاده شد. میزان مقاومت به صورت درصد کلیه‌های رشد کرده بر روی محیط‌های کشت حاوی دارو گزارش گردید (۱۶).

**استخراج DNA باکتری - جهت استخراج DNA**، ابتدا باکتری از سطح محیط لونشتهن جانسون برداشت شد و به لوله‌ی میکروسانتریفوج حاوی یک میکرولیتر بافر TE منتقل شد. روش CTAB که توسط گوری و همکاران طراحی شده جهت استخراج DNA کروموزومال بکار رفت (۱۷). به طور خلاصه، ابتدا سوسپانسیون در دمای ۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۶۰ دقیقه قرار داده شد تا باکتری‌ها کشته شوند. سپس سوسپانسیون با لیزوژیم ۱ میلی‌گرم در میلی‌لیتر در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت یک ساعت مجاور شد. سوسپانسیون حاصل با SDS یک درصد و ۰/۱ میلی‌گرم در میلی‌لیتر پروتئیناز K در دمای ۶۵ درجه به مدت ۱۰ دقیقه انکوبه شد. برای کامل شدن تلاشی باکتری از N-اتیل-NNN-تری متیل آمونیوم بروماید در دمای ۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، به مدت ۱۰ دقیقه استفاده شد. DNA استخراج شده از باکتری‌های متلاشی شده با استفاده از کلروفرم-ایزوآمیل الکل و سپس رسوب دادن با ایزوپروپانول جدا شد. غلظت DNA نیز با اسپکتروفوتومتر اندازه‌گیری شد.

**تشخیص موتاسیون katG S315T با استفاده از PCR-RFLP**- از PCR-touchdown، کتلرهای مثبت و منفی و شرایط استریل جهت تکثیر نواحی مورد نظر استفاده شد. در طی این مرحله، katG ناچیزه‌ی ۳۵۵ جفت بسازی ژن G (Genbank accession BX842578 region 75186-77408) با استفاده از پرایمرهایی که احمد و همکاران ارایه نموده بودند تکثیر شد (۱۸).

## روش بررسی

جداسازی مایکروبکتریوم توبرکولوزیس، کشت و تشخیص - ۱۲۶ نمونه‌ی باسیل سل جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل اصفهان، انتستیتو پاستور و بیمارستان مسیح دانشوری تهران موجود در بانک میکروبی بخش مایکروبکتریولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. پس از کشت اولیه بر روی محیط لونشتهن جانسون و رنگ آمیزی زیل نلسون، از تست‌های تولید نیاسین، احیای نیترات، IS6110 PCR، مورفولوژی کلی، تولید پیگمان و سرعت رشد برای تشخیص باکتری استفاده شد. جهت انجام IS6110 PCR از پرایمرها و روشی استفاده شد که هلیر و همکارانش ارائه نموده بودند (۱۴).

تست تعیین حساسیت به ایزو نیازید - از محیط لونشتهن جانسون و روش مرسوم نسبی ۱ درصد که توسط کاتی و همکارانش ابداع شده جهت انجام تست تعیین حساسیت به ایزو نیازید استفاده شد (۱۵). به طور خلاصه در این روش، غلظت مناسب ایزو نیازید (۰/۲ میکروگرم در میلی‌لیتر) در محیط لونشتهن جانسون تهیه شد و سپس این محیط به وسیله‌ی ۰/۱ میلی‌لیتر از غلظت  $10^{-2}$  و  $10^{-4}$  جدا شده باسیل سل که از سوسپانسیون یک مکفارلنند تهیه شده بود کشت داده شد. از محیط فاقد ایزو نیازید بعنوان محیط شاهد استفاده شد. محیط‌های کشت این مرحله، به مدت ۳ هفته در انکوباتور ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار داده شد. اگر تعداد کلیه‌های رشد کرده بر روی محیط کشت حاوی دارو کمتر از ۱ درصد محیط کشت فاقد ایزو نیازید باشد، باسیل جدا شده‌ی مربوطه حساس تلقی می‌شود و اگر تعداد کلیه‌های محیط کشت حاوی دارو، ۱ درصد یا بیشتر از محیط کشت فاقد دارو باشد ایزو لوله‌ی مورد نظر، مقاوم تلقی می‌گردد. نتایج تست تعیین حساسیت، با استفاده از محیط H37Rv ATCC 27294 ۷H10 تائید شد. از باسیل سل

۹۶ نفر از بیماران ایرانی (۷۶/۲ درصد) و ۳۰ نفر (۲۳/۸ درصد) افغانی بودند.

الگوهای مقاومت به ایزونیازید - از ۱۲۶ نمونه‌ی جدا شده باسیل سل، ۳۲ سویه (۲۵/۴ درصد) مقاوم به ایزونیازید بودند. میزان مقاومت در نمونه‌های جمع آوری شده در اصفهان ۲۲/۶ درصد (۱۹ مورد) و در تهران ۳۱ درصد (۱۳ سویه) بود.

**تشخیص و آنالیز موتاسیون در کدون ۳۱۵ ژن katG-PCR** قطعه‌ی IS6110 در مورد تمام نمونه‌های جدا شده با تکثیر محصول، ۱۲۳ جفت بازی همراه بود که بروی ژل آگارز ۲ درصد الکتروفورز شد (شکل ۱). موتاسیون ACC در کدون ۳۱۵ ژن katG با استفاده از PCR قطعه‌ی مربوط به کدون ۳۱۵ و سپس تاثیر آنزیم محدود کننده MspI (سایت برش C↑CGG) تشخیص داده شد (PCR-RFLP). موتاسیون CCGG به AGC (CCGG به ACC) با کسب یک سایت برش جدید برای آنزیم MspI همراه بود. قطعه‌ی تکثیر یافته‌ی باسیل سل H37Rv همانند جدا شده‌های کلینیکی فاقد ACC در کدون ۳۱۵ بود. بنابراین محصول هضم MspI در این موارد، سه قطعه ۱۵۱، ۱۱۴ و ۷۹ جفت بازی گردید.

در حالیکه قطعات مربوط به جدا شده‌های دارای ACC (Ser315Thr) در کدون ۳۱۵ (سرین به تره اونین) با استفاده از PCR-RFLP و آنزیم محدود کننده MspI در ۲۳ مورد از تعداد کل ۳۲ سویه‌های جدا شده مقاوم به ایزونیازید تشخیص داده شد. جدول شماره یک توزیع فراوانی موتاسیون‌های ایجاد کننده مقاومت در انواع

katG F: 5'-CCC ATG GCC GCG GCG GTC  
GAC ATT-3'  
katG R: 5'-CGC CGT CCT TGG CGG TGT  
ATT GCC-3'

حجم نهایی مخلوط PCR، ۵۰ میکرولیتر و حاوی بافر Roche PCR پیکومول از هر پرایمر، ۱۰ نانوگرم DNA استخراج شده، ۰/۱ میکرومولار dNTP و ۲ واحد آنزیم Taq (سیناژن) بود. PCR با استفاده از ماستر سایکلر اپندورف ۵۳۳۲ انجام گرفت. تلاشی اولیه‌ی پروتئین‌ها در دمای ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۳ دقیقه، ۹۷ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت یک دقیقه و در ادامه، سه سیکل شامل یک دقیقه در دمای ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، ۳۰ ثانیه در ۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد و یک دقیقه در دمای ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد، سه سیکل شامل یک دقیقه در دمای ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، ۳۰ ثانیه در دمای ۶۳ درجه‌ی سانتی‌گراد و یک دقیقه در ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد، سه سیکل شامل یک دقیقه در ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، ۳۰ ثانیه در دمای ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد، سه سیکل شامل یک دقیقه در ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد و یک دقیقه در دمای ۶۱ درجه‌ی سانتی‌گراد، سه سیکل شامل یک دقیقه در ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، سه سیکل شامل یک دقیقه در ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد و یک دقیقه در دمای ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، سه سیکل شامل یک دقیقه در ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، ۳۰ ثانیه در دمای ۵۹ درجه و یک دقیقه در دمای ۹۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، ۳۰ ثانیه در دمای ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد و ۵ دقیقه در دمای ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد برای ۵ دقیقه انجام شد.

#### یافته‌ها


**اطلاعات دموگرافیک** - از میان ۱۲۶ نمونه‌ی باسیل سل، ۸۴ مورد (۶۷ درصد) مربوط به شهر اصفهان و ۴۲ مورد (۳۳ درصد) مربوط به تهران (۳۴ بیمار از انسیتوپاستور و ۸ بیمار از بیمارستان مسیح دانشوری) بود. ۸۵ نفر از بیماران مرد (۶۷/۵ درصد) و ۴۱ نفر (۳۲/۵ درصد) زن بودند.

ایزوله‌های مقاوم به ایزونیازید (۲۲ سوش) را توانستیم با استفاده از آنالیز تنها لوکوس 315 *katG* تشخیص دهیم. موتاسیونی در ۹ سوش باقی‌مانده در این لوکوس مشاهده نشد. هیچ یک از سویه‌های حساس نیز موتاسیونی در کدون ۳۱۵ نداشتند (جدول ۱).

جدا شده مقاوم را در شهرهای اصفهان و تهران نشان می‌دهد. از ۲۳ مورد ذکر شده ۱۵ مورد به اصفهان، ۷ مورد به انسستیتو پاستور و یک مورد نیز به بیمارستان مسیح دانشوری تعلق داشت. نتیجه‌ی تعیین توالی DNA در شکل ۲c وجود این موتاسیون را تایید می‌کرد. به عبارت دیگر، ۷۲ درصد


جدول ۱: توزیع فراوانی موتاسیون‌های ایجادکننده مقاومت در انواع باسیل سل مقاوم به ایزونیازید در شهرهای اصفهان و تهران

تعداد	درصد	katG		موتاویون احتمالی در سایر		نواحی	نوع موتاسیون	جمع	شهر
		تعداد	درصد	تعداد	درصد				
۱۹	۱۰۰ درصد	۱۵	۷۸/۹	۴	۲۲/۱				اصفهان
۱۳	۱۰۰ درصد	۸	۶۱/۵	۵	۳۸/۵				تهران
۳۲	۱۰۰ درصد	۲۳	۷۱/۹	۹	۲۸/۱				جمع




شکل ۱: الکتروفورز قطعه‌ی آمپلی فای شده‌ی ۱۲۳ جفت بازی IS6110 بروی ژل آگارز ۲ درصد (لاین‌های ۱ تا ۴). DNA لدر فرمانتانس ۱۰۰ جفت بازی (لاین L)

L1




a)



b)

21bp



شکل ۲: آمپلیفیکاسیون ناحیه‌ی ژنی *katG* اطراف کادون ۳۱۵ با پرایمرهای *katG F, R* (شکل a و باندهای ۱، ۳، ۵، ۷ و ۹ شکل b). الگوهای *RFLP* آمپلیفیکاسیون *katG* بعد از هضم جدا شده‌های کلینیکال مایکروبکتریوم توبرکولوزیس مقاوم به ایزونیازید (باند ۲) و حساس به ایزونیازید (باندهای ۴، ۶، ۸). یک *DNA* لدر ۱۰۰ جفت بازی (لاین L1) و یک *DNA* لدر ۲۰ جفت بازی (لاین L2) در باندهای آخر قرار دارد. الگوی موجود در باند ۲ مشخصه‌ی جانشینی S315T در کادون ۳۱۵ است. جزئیات الگوهای *RFLP* در متن آمده است. شکل a مربوط به ژل آگارز ۱ درصد و شکل b مربوط به ژل پلی اکریلامید ۱۰ درصد است. در شکل C الکتروفوروگرام سکونسینگ *DNA* پس از آمپلیفیکاسیون *PCR* با *katG* آورده شده است. (مربوط به نمونه‌ی لاین ۱ شکل 2b) شکل نشان‌دهنده‌ی یک موتابسیون در کادون ۳۱۵ است. (AGC→ACC, Ser→Thr)

ابتلا به سل در آن بالاست. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ایران یکی از مناطق اندمیک انواع جدادشده‌های مقاوم به دارو نیز هست (۵و۳). بنابراین بکار بردن روش‌های مولکولی برای تشخیص موتابسیون‌هایی که مرتبط با مقاومت دارویی است می‌تواند زمان مورد نیاز برای شناسایی انواع مقاوم را تا حدود زیادی کاهش دهد. در حال حاضر تست‌های شناسایی ژنتیکی مقاومت به داروهای ضد سل، به واسطه‌ی سرعت عمل و نتایج موثق، گزینه‌ی مناسبی برای جانشینی تست‌های مرسوم تعیین حساسیت محسوب می‌شود (۷). گرچه مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که در بروز مقاومت به ایزونیازید ممکن است انواع مختلفی از موتابسیون‌ها در مناطق ژنی گوناگون دخالت داشته باشد، ولی شیوع بالای جانشینی سرین با تره اونین در کادون ۳۱۵ *katG* شناسایی این موتابسیون را روش مناسبی برای غربالگری مقاومت به ایزونیازید در

## بحث

در حال حاضر تست‌های تعیین حساسیت دارویی به عنوان ابزاری مناسب برای انتخاب رژیم‌های درمانی مناسب جهت درمان موفق مسلولین مخصوصاً سل مقاوم چند دارویی بکار می‌رود. از سویی نیز انجام این تست‌ها، ارزیابی میزان تاثیر برنامه‌ی کترل سل به خصوص انواع سل مقاوم به دارو را ممکن می‌سازد (۲۱). روش‌های مختلفی برای تعیین حساسیت باسیل سل به داروهای ضد سل وجود دارد ولی هیچیک از آنها کامل نیست و نتایج آنها پزشکان را برای درمان موثر مسلولین چندان راضی نمی‌کند. جهت انجام روش‌های متداول کلینیکی مثل روش نسبی و روش مطلق، نیاز به پرسنل کارآمد و ماهر و صرف زمان طولانی و هزینه‌ی بالا می‌باشد و در عین حال نتایج این تست‌ها چندان قابل تکرار و مطمئن نیست (۲۲). ایران یکی از کشورهایی است که میزان

رابطه‌ی مشخص بین وجود موتاسیون در کدون ۳۱۵ و مقاومت به ایزونیازید در انواع جداشده‌ی باسیل سل وجود دارد (۳۱). در این مطالعه، ما از روش PCR-RFLP تشخیص موتاسیون S315T در katG استفاده کردیم و قطعه‌ی ۳۵۵ جفت بازی حاصل از تکثیر ژن katG با استفاده از آنزیم محدود کننده‌ی *MspI* هضم شد. موتاسیون‌هایی که در کدون ۳۱۵ اتفاق می‌افتد می‌تواند باعث تغییر در سایتهاي برش *MspI* گردد که با آنالیز RFLP قابل PCR- پيگير است. بدین ترتیب می‌توان دریافت که RFLP ابزار مناسبی برای شناسایی جهش‌ها فراهم می‌آورد. با استفاده از این تکنیک می‌توان در مناطقی که انواع جدا شده‌ی باسیل سل مقاوم به ایزونیازید دارای فراوانی بالایی هستند، لال جهش‌یافته را از انواع وحشی افتراق داد. از سویی این روش تا حدودی ارزان است و تنها نیازمند انجام PCR معمول و در پی آن الکتروفورز می‌باشد. بنابراین می‌توان این روش را به صورت معمول در بسیاری از آزمایشگاه‌های نه چندان پیشرفته انجام داد. باکونیت و همکارانش، حساسیت و ویژگی PCR-RFLP را به ترتیب ۸۵/۷ و ۱۰۰ درصد تعیین نمودند (۳۱). نتایج مطالعه‌ی اخیر نیز مانند اکثر مطالعات انجام گرفته در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از انواع جداشده‌ی باسیل سل مقاوم به ایزونیازید دارای جهش S315T در ژن katG هستند.

با توجه به شواهد موجود در خصوص شیوع بالای جهش katG در S315T در مناطق مختلف ایران بنظر می‌رسد که تکنیک PCR-RFLP را بتوان به عنوان ابزاری ساده و سریع جهت تشخیص مقاومت به ایزونیازید در باسیل‌های سل کلینیکی معرفی نمود، تا با انجام تنها یک تست بتوان درصد قابل ملاحظه‌ای از جدا شده‌های مقاوم به ایزونیازید را تشخیص داد. مطالعه‌ی حاضر نشان می‌دهد که می‌توان باسیل‌های سل مقاوم به ایزونیازید را از طریق بررسی منطقه‌ای که بیشترین تغییرات ژنتیکی را در ژن katG متحمل

انواع کلینیکی باسیل سل مطرح می‌سازد. مطالعات فراوان انجام گرفته حاکی از آن است که مقاومت به ایزونیازید تا حدود زیادی در رابطه با موتاسیون‌هایی است که در katG اتفاق می‌افتد. آبال و همکارانش در مطالعه‌ای، نشان دادند که ۶۹ درصد انواع مقاوم به ایزونیازید در کویت، حاصل جانشینی S315T در katG بودند (۲۰). مطالعات دیگر انجام گرفته فراوانی این نوع موتاسیون را در ترکیه ۶۳ درصد، در روسیه ۹۸ درصد، در دبی ۶۴ درصد، و در بیروت ۳۵ درصد نشان می‌دهد (۲۴ و ۱۲ و ۲۱)، سایر مطالعات میزان شیوع این موتاسیون را ۷۴ درصد در دهلی، ۵۴ درصد در کره جنوبی و ۵۵ درصد در هلند نشان می‌دهند (۲۵ و ۲۶ و ۲۳). احمد و همکارانش نشان دادند که اکثر انواعی که به سه یا چند دارو مقاومند و MDR محسوب می‌شوند (۷۲/۷ درصد) حامل جانشینی S315T هستند و ۷۰ درصد ایزوله‌های دبی (امارات متحده عربی) که تنها به ایزونیازید مقاومت دارند حامل این نوع موتاسیون می‌باشند (۲۷). دوستار و همکارانش در طی مطالعه‌ای که به تازگی انجام گرفته، نشان دادند حدود ۵۶ درصد از انواع جدا شده باسیل سل مقاوم به ایزونیازید katG در ایران سرین به ترہ اوینین در کدون ۳۱۵ ژن katG هستند (۲۸). ذاکر بستان آباد و همکارانش نیز در مطالعه‌ای در شرق ایران، فراوانی این نوع موتاسیون را ۶۱ درصد تعیین کرده‌اند (۲۹). همچنین مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که وجود ترہ اوینین در کدون ۳۱۵، برای مقاومت به ایزونیازید ۱۰۰ درصد اختصاصی است و هیچ سویه‌ی حساسی این اسید آمینه را در موقعیت ۳۱۵ ندارد (۳۰) در مطالعه‌ای که انجام دادیم فراوانی موتاسیون در کدون ۳۱۵ ژن katG در میان انواع باسیل سیل مقاوم به ایزونیازید، ۷۲ درصد بود و بدین ترتیب می‌توان دریافت که این نوع موتاسیون تا حدود زیادی می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ی مقاومت به ایزونیازید در جمعیت باسیل‌های سل منطقه باشد. نتایج مطالعه‌ی ما به همراه سایر مطالعاتی که اخیراً انجام گرفته نشان می‌دهد که

که باسیل سل کلینیکی حامل موتاسیون در کدون ۳۱۵ ژن کماکان بیماریزا می‌ماند (۳۲). طبق مطالعه‌ی انجام شده می‌توان پیش‌بینی کرد که در کشورهای در حال توسعه، غربالگری باسیل سل برای حضور موتاسیون S315T ممکن است ابزار مفیدی را جهت تشخیص انواع مقاوم به ایزونیازید فراهم نماید تا بتوان دستورالعمل مفیدی را برای کنترل و مهار مقاومت دارویی تدوین نمود.

### تشکر و قدردانی

از آقایان دکتر نصر اصفهانی، یزدانی، صالحی، بهره‌مند، کریمی، رادی، عجمی، متیاری (Mitari)، بروش (Brosch)، زینف (Zainulf)، حسن زاده و همایی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند، صمیمانه متشکریم.

می‌شود و باعث تغییر توالی اسید آمینه‌ای می‌گردد غربالگری نمود. البته می‌بایست یادآور شد که تنها با بررسی موتاسیون S315T نمی‌توان تمام انواع مقاومت به ایزونیازید را تشخیص داد و کماکان جهت بررسی کل ایزوله‌ها نیاز به انجام تست‌های مرسوم تعیین حساسیت می‌باشد و این امر ناشی از وجود موتاسیون‌های متنوعی است که در مناطق مختلفی از ژنوم باکتری روی می‌دهد.

### نتیجه‌گیری

در مطالعه‌ای که انجام گرفت حذف کامل *katG* مشاهده نشد. بدین ترتیب می‌توان تصور کرد که عدم حضور ژن *katG* می‌تواند برروی بقای انواع جدا شده اثر منفی داشته باشد. از سوی دیگر نتیجه‌ی فوق تأییدی بر این فرضیه است

### منابع

- 1- Frieden TR, Sterling TR, Munsiff SS, Watt CJ, Dye C. Tuberculosis. *Lancet*. 2003; 362: 887-99.
- 2- Corbett EL, Watt CJ, Ealker N, et al. The growing burden of tuberculosis: global trends and interactions with the HIV epidemic. *Arch Intern Med*. 2003; 163: 1009-21.
- 3- Morris RP, Nguyen L, Gatfield J, Visconti K, Nguyen K. Ancestral antibiotic resistance in *Mycobacterium tuberculosis*. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2005; 102: 12200-5.
- 4- Armstrong S, McDermott R, Klavdt K. TB: WHO report on the tuberculosis epidemic. Geneva, WHO, 1997. 52.
- 5- Davis PD. The worldwide increase in tuberculosis: how demographic changes, HIV

infection and increasing numbers in poverty are increasing tuberculosis. *Ann Med*. 2003; 35: 235-43.

6- Narvskaya O, Otten T, Limeschenco E, et al. Nosocomial outbreak of multidrug-resistant tuberculosis caused by a strain of *Mycobacterium tuberculosis* W-Beijing family in St.Petersburg, Russia. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2002; 21: 596-602.

7- Tavakoli A, Safaei HG, Navvabakbar F, Salehi M, Bahremand A, NasrIsfahani B. Mutations in the *rpoB* gene of rifampin resistant *Mycobacterium tuberculosis* isolates in Isfahan by PCR-SSCP. *J Sci IR IRAN*. 2005; 16(2): 131-8.

8- Mohammad S, Ibrahim P and Sadikun A. Susceptibility of *Mycobacterium tuberculosis* to

- isoniazid and its derivative, 1-isonicotinyl-2-nonenoyl hydrazine: *investigation at cellular level* *Tuberculosis*. 2004; 84: 56-62.
- 9- Espinal MA, Kim SJ, Suarez PG, et al. Standard short-course chemotherapy for drug-resistant tuberculosis: treatment outcomes in 6 countries. *JAMA*. 2000; 283: 2537-45.
- 10- Amiri MV, Mirsaeli SM, Mohajer K, Mansoori SD, Tabarsi P, Masjedi MR. Pattern of drug resistance in pulmonary TB patients. *Tanaffos*. 2003; 2: 47-51.
- 11- Paramasivan CN, Venkataraman P. Drug resistance in tuberculosis in India. *Indian J Med Res*. 2004; 120: 377-86.
- 12- Aktas E, Durmaz R, Yang D, Yang Z. Molecular characterization of isoniazid and rifampin resistance of *Mycobacterium tuberculosis* clinical isolates from Malatya, Turkey. *Microb Drug Resist*. 2005; 11: 94-9.
- 13- Ramaswamy S, Musser JM. Molecular genetics basis of antimicrobial agent resistance in *Mycobacterium tuberculosis*. *Tuber Lung Dis*. 1998; 79: 3-29.
- 14- Tang X, Morris SL, Langone JJ, Bockstahler LE. Microarray and allele specific PCR detection of point mutations in *Mycobacterium tuberculosis* genes associated with drug resistance. *J Microbiol Methods*. 2005; 63: 318-30.
- 15- Mo L, Zhang W, Wang J, et al. Three-dimensional model and molecular mechanism of *Mycobacterium tuberculosis* catalase-peroxidase (katG) and isoniazid-resistant katG mutants. *Microb Drug Resist*. 2004; 10: 269-79.
- 16- Lavender C, Globan M, Sievers A, Billmen-Jocobe H, Fyfe J. Molecular characterization of isoniazid-resistant *Mycobacterium tuberculosis* isolates collected in Australia. *Antimicrob Agents Chemother*. 2005; 49: 4068-74.
- 17- Yu S, Girotto S, Lee C, Magliozzo RS. Reduced affinity for isoniazid in the S315T mutant of *Mycobacterium tuberculosis* katG is a key factor in antibiotic resistance. *J biol Chem*. 2003; 278: 14769-75.
- 18- Canetti G, Fox W, khomenko A, et al. Advances in techniques of testing mycobacterial drug sensitivity, and the use of sensitivity tests in tuberculosis control programmes. *Bull World Health Organ*. 1969, 41: 21-43.
- 19- Ozturk CE, Balbay OA, Kaya D, et al. The resistance to major antituberculosis drugs of *Mycobacterium tuberculosis* strains isolated from the respiratory system specimens of tuberculosis patients in Duzce, Turkey. *Jap J Infect Dis*. 2005; 58: 47-9.
- 20- Gori A, Esposti AD, Bandera A, et al. Comparison between spoligotyping and IS6110 restriction fragment length polymorphism in molecular genotyping analysis of *Mycobacterium tuberculosis* strains. *Mol Cell Probes*. 2005; 19: 236-44.
- 21- Ahmad S, Mokaddas E. Contribution of AGC to ACC and other mutations at codon 315 of the katG gene in isoniazid-resistant *Mycobacterium tuberculosis* isolates from the Middle East. *Int J Antimicrob Agents*. 2004; 23: 473-9.

- 22- Cockerill FR 3rd, Uhi JR, Temesgen Z, et al. Rapid identification of a point mutation of the *Mycobacterium tuberculosis* catalase-peroxidase (*katG*) gene associated with isoniazid resistance. *J Infect Dis.* 1995; 171: 240-5.
- 23- Abal AT, Ahmad S, Mokaddas E. Variations in the occurrence of S315T mutation with in *katG* gene in isoniazid-resistant clinical *Mycobacterium tuberculosis* isolated from Kuwait. *Microb Drug Resist.* 2002; 8: 99-105.
- 24- Shemyakin IG, Stepanshina VN, Ivanov IY, et al. Characterization of drug-resistant isolates of *Mycobacterium tuberculosis* derived from Russian inmates. *Int J Tuberc Lung Dis.* 2004; 8:1194-203.
- 25- Van soolingen D, de Hass PE, Van Doorn HR, et al. Mutations at amino acid position 315 of the *katG* gene are associated with high-level resistance to isoniazid, other drug resistance, and successful transmission of *Mycobacterium tuberculosis* in the Netherlands. *J Infect Dis.* 2000; 182: 1788-90.
- 26- Marttila H, Soini H, Huovinen P, Viljanen M. *KatG* mutations in isoniazid-resistant *Mycobacterium tuberculosis* isolates recovered from Finnish patients. *Antimicrob Agents Chemother.* 1996; 40: 2187-9.
- 27- Haas WH, Schilke K, Brand J. et al. Molecular analysis of *katG* gene mutations in strains of *Mycobacterium tuberculosis* complex from Africa. *Antimicrob Agents Chemother.* 1997; 41: 1601-3.
- 28- Doustar F, Khosravi AD, Farnia P, Masjedi MR, Velayati AA. Molecular analaysis of isoniazid resistance in different genotypes of *Mycobacterium tuberculosis* isolated from Iran. *Microb Drug Resist.* 2008, 14: 273-9
- 29- Zakerbostanabad S, Titov LP, Bahremand AR. Frequency and molecular characterization of isoniazid resistance in *katG* region of MDR isolates from tuberculosis patients in southern endemic border of Iran. *Infect Genet Evol.* 2008, 8: 15-9.
- 30- Ahmad S, Fares E, Araj GF, Chaugh TD, Mustafa AS. Prevalence of S315T mutation within the *katG* gene in isoniazid-resistant clinical *Mycobacterium tuberculosis* isolates from Dubai and Beirut. *Int J Tuberc Lung Dis.* 2002; 6: 920-6.
- 31- Leung ET, Kam KM, Chiu A, et al. Detection of *katG* Ser315Thr substitution in respiratory specimens from patients with isoniazid-resistant *Mycobacterium tuberculosis* using PCR-RFLP. *J Medi Microbiol.* 2003; 52: 999-1003.
- 32- Bakonyte D, Baranauskaiet A, Cicenaite J, Sosnovskaja A, Stakenas P. Molecular characterization of isoniazid-resistant *Mycobacterium tuberculosis* clinical isolates in Lithuania. *Antimicrob Agents Chemother.* 2003; 47: 2009-11.

## ***Detection of Mutation in Codon 315 katG Gene as a Gene Marker Associated with Isoniazid Resistance, in *Mycobacterium tuberculosis* Strains Isolated from Patients in Isfahan and Tehran by PCR-RFLP Method***

**Mohajeri P<sup>1</sup>, Tavakoli A<sup>2</sup>, Moghim S<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dept. of Microbiology, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Science, Kermanshah, Iran

<sup>2</sup>Dept. of Bacteriology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran

**Corresponding Author:** Mohajeri P. Dept. of Microbiology, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Science, Kermanshah, Iran

**E-mail:** p\_mohajeri@yahoo.com

**Received:** 17 Nov 2008      **Accepted:** 30 May 2009

**Background and Objective:** Drug resistance to tuberculosis is continuously increasing and is a significant threat to tuberculosis control programs because a few effective drugs are present against *Mycobacterium tuberculosis*. Although isoniazid (INH) is the most effective drug against tuberculosis, resistance to this drug also develops readily. Mutations in *katG*, specially the Ser315Thr substitution, are responsible for isoniazid resistance in a large proportion of patients with tuberculosis. However, the frequency of the *katG* Ser315Thr substitution varies among population samples. This study provided molecular characterization of isoniazid resistance of *M. tuberculosis* strains and extended our knowledge about molecular basis of *M. tuberculosis* drug resistance that is widely applicable for rapid drug resistance detection.

**Materials and Methods:** Using 1% proportional method, the sensitivity of 126 strains isolated from patients in Isfahan and Tehran to isoniazid was determined. The *katG* mutations in codon 315 associated with isoniazid resistance among isoniazid resistant isolates was determined by PCR-RFLP. In this way, 355 bp PCR products were digested by *MspI*.

**Results:** Out of 126 isolates of *M. tuberculosis*, 32 (25.4%) strains were determined as INH resistant. Resistance rate was 22.6% (19 strains) in Isfahan and 31% (13 strains) in Tehran. Overall, 72% of isoniazid-resistant isolates could be identified by analysis of just *katG* 315 loci.

**Conclusion:** The PCR-RFLP using *MspI* restriction enzyme that detects *katG* Ser315Thr substitution could be identified in 72% of isoniazid-resistant strains. Elucidation of the molecular characterization of isoniazid resistance in *M. tuberculosis* has led to the development of different genotypic approaches to the rapid detection of isoniazid resistant in clinical isolates.

**Key words:** *Mycobacterium Tuberculosis, Isoniazid, PCR-RFLP, KatG, Isfahan, Tehran*